

殺虫剤

名称:アクトラ粒剤5
種類:チアメトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

2021年8月25日現在

適用の範囲と使用方法								2021年6月26日現在
作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数	
きゅうり	ー	アブラムシ類 コナジラミ類 トマトハモグリバエ	1g／株	定植時	1回	植穴処理	4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	
なす		ミナミキイロアザミウマ マメハモグリバエ コナジラミ類 コガネムシ類幼虫						
		アブラムシ類		育苗期後半		株元散布		
		ミカンキイロアザミウマ	2g／株	定植時		植穴処理		
トマト		ハモグリバエ類	1～2g／株	育苗期後半		株元散布		
		コナジラミ類	1g／株					
		ミニトマト	ハモグリバエ類	1～2g／株		定植時	植穴処理	3回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は2回以内)
ピーマン		コナジラミ類	1g／株	育苗期後半		株元散布		
とうがらし類		ミナミキイロアザミウマ	2g／株	定植時		植穴処理	4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	
		アブラムシ類	1g／株				4回以内(定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)	
カリフラワー		アブラムシ類	0.5g／株	育苗期後半		株元散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	

殺虫剤

名称: アクトラ粒剤5
種類: チアメトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

2021年8月25日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー		アオムシ ハイマダラノメイガ	2g/株	育苗期後半	1回	株元散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
		コナガ	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3~4L)当り20~30g	は種時		散布	
キャベツ	ー	アブラムシ類	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3~4L)当り30g	育苗期後半		株元散布	
			1~2g/株			全面土壌混和	
			苗地床1㎡当り6g	は種前		植穴処理	
		ハイマダラノメイガ	2g/株	定植時		株元散布	
				育苗期後半		散布	
		コナガ	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3~4L)当り20~30g	は種時		床土混和	
			15g/培土L	は種前		株元散布	
		アオムシ	2g/株	育苗期後半			

殺虫剤

名称: アクタラ粒剤5
種類: チアメトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

2021年8月25日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
はくさい	—	アオムシ	2g／株	育苗期後半	1回	株元散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
		コナガ	15g／培土L	は種前		床土混和	
			アブラムシ類	1～2g／株		育苗期後半	
すいか		2g／株		定植時	2回以内	植穴処理	4回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内)
いちご		1g／株					4回以内(定植時の植穴処理は2回以内、散布は2回以内)
メロン		ハモグリバエ類	2g／株	定植時	1回	株元散布	4回以内(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)
		アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	1g／株				
レタス		アブラムシ類	0.5g／株	育苗期後半		1回	株元散布
		ナモグリバエ	15g／培土L	は種前	床土混和		
非結球レタス		アブラムシ類	0.5g／株	育苗期後半	1回	株元散布	1回
		ナモグリバエ	15g／培土L	は種前		床土混和	

殺虫剤

名称: アクタラ粒剤5
種類: チアメトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

2021年8月25日現在

適用の範囲と使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
かんしょ	—	アブラムシ類	6kg/10a	育苗期	1回	株元散布	1回
		コガネムシ類幼虫	6～9kg/10a			作条混和	
全面土壌混和							
さといも		アブラムシ類	6kg/10a	植付前		作条混和	
		コガネムシ類幼虫					
やまのいも		アブラムシ類	6kg/10a	萌芽期		株元散布	4回以内(粒剤の処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
		ナガイモコガ				植溝土壌混和	
ばれいしょ		アブラムシ類	2～6kg/10a	植付時		作条混和	4回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は3回以内)
ねぎ		ネギアザミウマ	6kg/10a	は種時			4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)
			6～9kg/10a	植付時			
わけぎ		ネギハモグリバエ	6kg/10a				
	ネギアザミウマ						

殺虫剤

名称: アクトラ粒剤5
種類: チアメトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

2021年8月25日現在

適用の範囲と使用方法

2021年8月28日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数		
あさつき	—	ネギアザミウマ	6kg/10a	植付時	1回	作条混和	1回		
		ネギハモグリバエ							
こまつな		アブラムシ類		は種時			3回以内(は種時の作条混和は1回以内、は種後は2回以内)		
チンゲンサイ		ハモグリバエ類		定植時			3回以内(定植時の作条混和は1回以内、散布は2回以内)		
セルリー		ナモグリバエ	2g/株	鉢上時	2回以内	土壌混和	2回以内(鉢上時の土壌混和は1回以内、定植時の植穴処理は1回以内)		
				定植時		植穴処理			
れんこん		クワイクビレアブラムシ	6kg/10a	収穫14日前まで	3回以内	湛水散布	3回以内		
だいこん		アブラムシ類	4kg/10a	は種時	1回	作条混和	3回以内(は種時の作条混和は1回以内、散布は2回以内)		
かぶ						全面土壌混和	4回以内(は種時の全面土壌混和は1回以内、散布は3回以内)		
にんじん		コガネムシ類幼虫					1回		
こんにゃく		アブラムシ類		培土時(但し、出芽前まで)		株元散布			
ほうれんそう				6kg/10a		は種時		3回以内(種子への処理及びは種時の作条混和は合計1回以内、散布は2回以内)	
のざわな								3回以内(は種時の作条混和は1回以内、は種後は2回以内)	
しゅんぎく								4回以内(は種時の作条混和は1回以内、散布は3回以内)	
		ハモグリバエ類							

殺虫剤

名称: アクタラ粒剤5
種類: チアメトキサム粒剤

適用の範囲と使用方法

2021年8月25日現在

適用の範囲と使用方法

2021年8月20日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
せり	水田	アブラムシ類	3kg/10a	親株養成期 但し、収穫100 日前まで	1回	湛水散布	1回
かんきつ (苗木)	—	ミカンハモグリガ	20～40g／樹	育苗期	2回以内	株元散布	3回以内
		コナカイガラムシ類 ミカンキジラミ	20g／樹				
つつじ類		コガネムシ類幼虫	9kg/10a	生育期	1回	全面土壌 混和	5回以内
		ツツジゲンバイ		植付時			
				6～9kg/10a		生育期	
花き類・観葉 植物		アブラムシ類	6kg/10a	3回以内	株元散布		6回以内
げっきつ		ミカンキジラミ	40g／樹				3回以内