

殺虫剤

名称:フォース粒剤

種類:テフルトリン粒剤

適用の範囲と使用方法

2021年11月24日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テフルトリンを含む農薬の総使用回数		
うめ	アカマダラケシキスイ	10kg/10a	収穫3日前まで	1回	全面土壌混和	1回		
かんしょ	ハリガネムシ類	9kg/10a	植付前		全面土壌混和又は作条土壌混和			
	コガネムシ類幼虫		は種時		播溝土壌混和又は全面土壌混和			
らっかせい	ネキリムシ類		4kg/10a		定植時		全面土壌混和	
キャベツ はくさい ブロッコリー 茎ブロッコリー								
非結球レタス レタス		9kg/10a	は種前					
ほうれんそう	ネキリムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	6~9kg/10a	は種時		1回		株元散布	2回以内 (は種時までの処理は1回以内、は種後は1回以内)
はつかだいこん	キスジノミハムシ							
だいこん			4~9kg/10a					
			タネバエ					
かぶ	キスジノミハムシ	4kg/10a	は種時	1回	1回	1回		
非結球あぶらな科 葉菜類	ネキリムシ類 キスジノミハムシ		は種前					
小倉はくさい菜								
なばな類			キスジノミハムシ				は種時	
にんじん	ネキリムシ類		4~12kg/10a				は種前	
	クロバネキノコバエ類		12kg/10a					
にんじん(葉)	ネキリムシ類		4kg/10a				は種時	作条土壌混和
ごぼう							は種前	全面土壌混和
							は種時	全面土壌混和
ねぎ	ネキリムシ類		4~9kg/10a				定植時	1回
	ネダニ類 クロバネキノコバエ類	9kg/10a						
	クロバネキノコバエ類	9kg/10a						
	ネダニ類	6~9kg/10a	収穫30日前まで	1回				

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テフルトリンを含む農薬の総使用回数
にら	ネキリムシ類	4~9kg/10a	定植前	1回	全面土壌混和	2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内)
	ネダニ類	9kg/10a			植溝土壌混和	
収穫14日前まで			1回	株元散布		
らっきょう	ネダニ類	9kg/10a	定植前	1回	全面土壌混和 植溝土壌混和	
		6~9kg/10a	収穫14日前まで	1回	株元散布	
パセリ	ネキリムシ類	4kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	1回
ザーサイ			キスジノミハムシ		定植時	
	は種時	全面土壌混和				
しょうが	ネキリムシ類	6~9kg/10a	萌芽期		株元散布	
いちご	コガネムシ類幼虫	6kg/10a	植付時(仮植床)	1回	全面土壌混和	2回以内(仮植床は1回以内、本圃は1回以内)
	ネキリムシ類		定植時		作条土壌混和	
やまのいも	タネバエ	4kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	1回
	ネキリムシ類	6kg/10a				
やまのいも(むかご)	タネバエ	4kg/10a				
さとうきび	ハリガネムシ類	6kg/10a				
みしまさいこ	ネキリムシ類					
茶	ナガチャコガネ	9kg/10a	成虫飛来初期からふ化幼虫期 但し、摘採7日前まで	1回	雨落ち部土壌混和	1回
つつじ類	コガネムシ類幼虫		植付時		全面土壌混和	