

## 殺虫殺菌剤

名称:ミネクトプラスター顆粒水和剤

種類:シアントラニリプロール・イソチアニル水和剤

適用の範囲と使用方法

2021 年 11 月 24 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ もみ枯細菌病 内穎褐変病	200 倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約 5L) 1 箱 当り 0.5L	は種時～ 移植当日	1 回	灌注	1 回	3 回以内(移植時までの処理は 1 回以内、本田では 2 回以内)
	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ	400 倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約 5L) 1 箱 当り 1L	は種時				
	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ もみ枯細菌病 内穎褐変病	高密度には種する場合は 50g/10a (育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約 5L) 1 箱当り 2.5～5g(希釈倍数 100～200 倍))	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約 5L) 1 箱 当り 0.5L	移植 10 日前～ 移植当日				