

## 殺菌剤

名称: アミスターオプティフロアブル

種類: アゾキシストロビン・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年11月24日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
きゅうり	べと病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 灰色かび病 菌核病 黒星病	1000 倍	100～ 400L/10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内	10 回以内(土壌灌注は 2 回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 8 回以内)
かぼちゃ	うどんこ病 べと病 疫病			収穫 7 日前まで	3 回以内			3 回以内
メロン	べと病 うどんこ病 つる枯病 菌核病			収穫 3 日前まで	4 回以内			5 回以内
すいか	炭疽病 つる枯病 うどんこ病 褐色腐敗病 菌核病			収穫前日まで	4 回以内			6 回以内(土壌灌注は 2 回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 4 回以内)
トマト	疫病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病 すすかび病 斑点病			収穫前日まで	2 回以内			2 回以内
ミニトマト	すすかび病 うどんこ病 褐色腐敗病 黒枯病 灰色かび病			収穫前日まで	4 回以内			4 回以内
なす	べと病 白斑病 黒斑病 白さび病			収穫 7 日前まで	2 回以内			3 回以内(は種又は定植前の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロ ピンを含む 農薬の 総使用回数	TPNを含む 農薬の総使用回数
にんじん	黒葉枯病 斑点病 菌核病 しみ腐病 うどんこ病	1000 倍	100～ 400L/10a	収穫 21 日前まで	2 回以内	散布	3 回以内(粒剤 は 1 回以内、 水和剤は 2 回 以内)	5 回以内(種子への 吹き付け処理は 1 回以内)
たまねぎ	灰色かび病 べと病			収穫 7 日前まで	4 回以内		4 回以内	6 回以内
ねぎ	べと病 さび病 黒斑病 黄斑病 葉枯病 小菌核腐敗病			収穫 14 日前まで	3 回以内		5 回以内(粒剤 は 1 回以内、 水和剤は 4 回 以内)	4 回以内(土壌灌注 は 1 回以内、散布 は 3 回以内)
にんにく	さび病 葉枯病			収穫 7 日前まで			3 回以内	6 回以内
だいこん	白さび病			収穫 45 日前まで			4 回以内(粒剤 は 1 回以内、 水和剤は 3 回 以内)	3 回以内
ピーマン	斑点病 うどんこ病 黒枯病 炭疽病 灰色かび病 疫病			収穫前日まで	4 回以内(粒剤 は 3 回以内)			
にがうり	うどんこ病			収穫 7 日前まで	3 回以内		4 回以内	