

殺菌剤

名称:レーバスフロアブル

種類:マンジプロパミド水和剤

適用の範囲と使用方法

2021 年 11 月 24 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンジプロパミドを含む 農薬の総使用回数				
ぶどう	べと病	2000~3000 倍	200~700L/10a		3 回以内	散布	3 回以内				
ばれいしょ	疫病	375~500 倍	25L/10a		2 回以内		2 回以内				
		1500~2000 倍	60~300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内		3 回以内				
だいず	べと病	1500~3000 倍									
あずき	茎疫病	1500~2000 倍									
		キャベツ						べと病	2000 倍	100~300L/10a	収穫 3 日前まで
ブロッコリー	2 回以内	2 回以内									
はくさい	3 回以内	3 回以内									
ほうれんそう	2 回以内	2 回以内									
レタス 非結球レタス	3 回以内	3 回以内									
ねぎ	白色疫病 べと病	2 回以内	2 回以内	2 回以内							
たまねぎ											
すいか					褐色腐敗病		3 回以内				
なす											
トマト	疫病	1500~2000 倍	200~700L/10a	収穫前日まで	3 回以内		3 回以内				
ミニトマト		2 回以内						2 回以内			
ピーマン											
かんきつ	褐色腐敗病	2000 倍	200~700L/10a	収穫前日まで	3 回以内		3 回以内				
いちじく											
いちご	疫病							100~300L/10a	親株育成期	2 回以内	4 回以内(苗床では 2 回以内、本圃では 2 回以内)
		育苗期	苗床:2 回以内								
		生育期、但し収穫前 日まで	本圃:2 回以内								
たばこ		1000 倍	100~180L/10a	収穫 10 日前まで	2 回以内	2 回以内					
ホップ	べと病	2000 倍	200~700L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	3 回以内					
バジル			100~300L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	2 回以内					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンジプロパドを含む 農薬の総使用回数
えだまめ	べと病	12 倍	800mL/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	無人航空機 による散布	3 回以内
		1500～3000 倍	100～300L/10a			散布	
	茎疫病	1500～2000 倍					