

殺虫剤

名称: アグリメック

種類: アバメクチン乳剤

適用の範囲と使用方法

2021 年 12 月 22 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アバメクチンを含む 農薬の総使用回数		
なす メロン ピーマン	アザミウマ類 ハダニ類 コナジラミ類	500～ 1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内		
きゅうり					2 回以内		2 回以内		
トマト	アザミウマ類 コナジラミ類 トマトサビダニ トマトハモグリバエ				アザミウマ類 ハダニ類		3 回以内	3 回以内	3 回以内
すいか	アザミウマ類 ハダニ類								
ねぎ	アザミウマ類 ネギハモグリバエ								
いちご	ハダニ類							親株育成期	2 回以内
				育苗期					
かんきつ	アザミウマ類	1000～ 2000 倍	200～ 700L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	無人航空機 による散布	3 回以内		
	チャノホコリダニ ミカンハモグリガ ミカンサビダニ ナメクジ類 ヨモギエダシヤク	2000 倍							
	アザミウマ類 チャノホコリダニ ミカンハモグリガ ミカンサビダニ	12 倍						4L/10a	
		24 倍	8L/10a						
30 倍		10L/10a							
茶	チャノキイロアザミウマ チャノナガサビダニ チャノホソガ カンザワハダニ チャノホコリダニ チャノコカクモンハマキ チャトゲコナジラミ チャノミドリヒメヨコバイ	1000 倍	200～ 400L/10a	摘採 7 日前まで	1 回	散布	1 回		
ホップ	ハダニ類		200～ 700L/10a	収穫 30 日前まで	2 回以内		2 回以内		
樹木類 (しきみを除く)	ネグサレセンチュウ	500 倍	—	移植前	1 回	60 分間 根部浸漬	1 回		

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アバメクチンを含む 農薬の総使用回数
しきみ	ネグサレセンチュウ	500 倍	—	移植前	1 回	60 分間 根部浸漬	2 回以内
	アザミウマ類	1000 倍	200～ 700L/10a	発生初期	2 回以内	散布	
花き類・観葉植物(ガーベラを除く)	アザミウマ類 ハダニ類	500 倍	100～ 300L/10a		5 回以内		5 回以内
ガーベラ							