

## 殺虫剤

名称: ジュリボフロアブル  
種類: クロラントラニプロール・チアメトキサム水和剤

適用の範囲と使用方法

2022年1月26日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アブラムシ類 アオムシ コナガ ネギアザミウマ ネキリムシ類 ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000倍	苗地床1㎡当り 2L	は種時 ～育苗期後半	1回	灌注	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
	アブラムシ類 アオムシ コナガ ネギアザミウマ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	200倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り 0.5L	育苗期後半 ～定植当日				
	アブラムシ類 アオムシ オオタバコガ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	4000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布		

## 殺虫剤

名称: ジュリボフロアブル  
種類: クロラントラニプロール・チアメトキサム水和剤

適用の範囲と使用方法

2022年1月26日現在

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
はくさい	アブラムシ類 カブラハバチ キスジノミハムシ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	200倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
	アブラムシ類 コナガ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ	4000倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布		

## 殺虫剤

名称: ジュリポフロアブル  
種類: クロラントラニリプロール・チアメトキサム水和剤

適用の範囲と使用方法

2022年1月26日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	アブラムシ類 アオムシ コナガ ネギアザミウマ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ	200倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
	アブラムシ類 アオムシ コナガ ハスモンヨトウ			収穫前日まで	3回以内			
レタス	アブラムシ類 オオタバコガ ナモグリバエ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	4000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)	3回以内 (種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、定植後の散布は2回以内)
	アブラムシ類 オオタバコガ カブラヤガ ナモグリバエ ハスモンヨトウ	200倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注		
非結球レタス	ヒメフタテンヨコバイ ヨトウムシ						4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)	1回

## 殺虫剤

名称: ジュリボフロアブル  
種類: クロラントラニプロール・チアメトキサム水和剤

適用の範囲と使用方法

2022年1月26日現在

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数		
ねぎ	タマネギバエ タネバエ ネギアザミウマ ネギハモグリバエ ネキリムシ類 ネダニ類	200倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、定植後の処理は3回以内)	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)		
	なばな類								アブラムシ類 アオムシ コナガ ハスモンヨトウ	4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)
パセリ	ハスモンヨトウ								2回以内 (灌注は1回以内、散布は1回以内)	