

## 殺虫剤

名称: マッチ乳剤

種類: ルフェヌロン乳剤

適用の範囲と使用方法

2022 年 2 月 24 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数
りんご	ハマキムシ類	2000 倍	200~700L/ 10a	収穫 14 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	キンモンホソガ	2000~3000 倍					
みかん	チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ ミカンサビダニ アゲハ類 ヨモギエダシヤク		2000~3000 倍	200~700L/ 10a	収穫 21 日前 まで		1 回
かんきつ (みかんを除く)							
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ		100~300L/ 10a	収穫 14 日前 まで	2 回以内		2 回以内
ばれいしょ	ハスモンヨトウ	3000 倍		収穫 7 日前 まで	3 回以内		3 回以内
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ	2000~3000 倍					
	ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	3000 倍					
はくさい		2000~3000 倍		収穫 14 日前 まで	3 回以内		3 回以内
だいこん	コナガ アオムシ	3000 倍					
非結球あぶらな科 葉菜類		2000 倍		収穫 3 日前 まで	3 回以内	3 回以内	
ブロッコリー	ハスモンヨトウ	3000 倍		収穫 7 日前 まで			
ねぎ	シロイチモジヨトウ	2000 倍		100~300L/ 10a	収穫 21 日前 まで	4 回以内	4 回以内
わけぎ							
トマト	オオタバコガ	2000~3000 倍	100~300L/ 10a	収穫前日まで	4 回以内	4 回以内	
	ハスモンヨトウ	3000 倍					
	アザミウマ類	1000~2000 倍					
	トマトサビダニ コナジラミ類	2000 倍					
	ハモグリバエ類	1000 倍					
ミニトマト	オオタバコガ	2000~3000 倍	100~300L/ 10a	収穫前日まで	2 回以内	2 回以内	
	ハスモンヨトウ	3000 倍					
	アザミウマ類 トマトサビダニ コナジラミ類	2000 倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数
なす ピーマン とうがらし類	オオタバコガ	2000 倍	100～300L/ 10a	収穫前日 まで	4 回以内	散布	4 回以内
レタス 非結球レタス				収穫 3 日前 まで	3 回以内		3 回以内
きゅうり	ウリノメイガ コナジラミ類	1000～2000 倍		収穫前日 まで	4 回以内		4 回以内
いちご	アザミウマ類		3000 倍	80～300L/ 10a	収穫 7 日前 まで		2 回以内
だいず	ハスモンヨトウ	100～300L/ 10a					
えだまめ	シソサビダニ		2000 倍	25L/ 10a	収穫 14 日前 まで		2 回以内
しそ		ヨトウムシ					
てんさい	ヨトウムシ カメノコハムシ アシグロハモグリバエ シロオビノメイガ	3000 倍	200～400L/ 10a	1 回	1 回		
	茶	チャハマキ チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノホソガ				2000～3000 倍	100～300L/ 10a
きく	アザミウマ類 マメハモグリバエ	1000 倍	発生初期	5 回以内	5 回以内		
花き類・観葉植物 (きくを除く)	ハスモンヨトウ	2000 倍					