

殺菌剤

名称：オロンディスウルトラSC

種類：オキサチアピプロリン・マンジプロバミド水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024年10月2日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサチアピプロリンを含む農薬の総使用回数	マンジプロバミドを含む農薬の総使用回数						
トマト	疫病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内						
ミニトマト														
レタス	べと病	16倍	1.6L/10a	収穫7日前まで		無人航空機による散布			2回以内	2回以内				
		2000倍	100～300L/10a			散布								
キャベツ		16倍	1.6L/10a			収穫3日前まで					無人航空機による散布			
		2000倍	100～300L/10a								散布			
はくさい		16倍	1.6L/10a			収穫7日前まで					無人航空機による散布			
		2000倍	100～300L/10a								散布			
非結球レタス		2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで		無人航空機による散布					2回以内	2回以内		
ブロッコリー														
バジル		16倍	1.6L/10a	収穫前日まで		無人航空機による散布								
ねぎ													2000倍	100～300L/10a
たまねぎ		疫病	2000倍	100～300L/10a		収穫7日前まで							無人航空機による散布	2回以内
ぶどう		べと病	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	散布	3回以内							
花き類・観葉植物（きくを除く）		疫病		100～200L/10a	発病前～発病初期			2回以内						
インパチェンスはばたん	べと病													

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。