

## 殺虫殺菌剤

## 名称：ミネクトブラスター顆粒水和剤

種類：シアントラニリプロール・イソチアニル水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2026 年 4 月 8 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	シアントラ ニリプロール を含む農 薬の総使用 回数	イソチアニル を含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ イナゴ類 もみ枯細菌病 内穎褐変病	200 倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 0.5L	は種時 ～移植 当日	1 回	灌 注	1 回	3 回以内（移植 時までの処理 は 1 回以内、 本田では 2 回 以内）
	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ	400 倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 1L	は種時				
	いもち病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ イナゴ類 もみ枯細菌病 内穎褐変病	高密度には 種する場合 は 50g/10a (育苗箱 (30 ×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当 り 2.5～5g (希釈倍数 100～200 倍))	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 0.5L	移植 10 日前～ 移植当 日				