

## 殺虫剤

名称: ファイントリムDF  
種類: インドキサカルブ水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年5月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	コナガ アオムシ	1000～2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	ヨトウムシ ハスモンヨトウ タマナギンウワバ ハイマダラノメイガ	2000倍						
はくさい	コナガ アオムシ	1000～2000倍		2000倍				収穫21日前まで
	ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ							
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ							収穫14日前まで
ブロッコリー	コナガ アオムシ							収穫前日まで
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000倍						
なす	ハスモンヨトウ オオタバコガ テントウムシダマシ類	2000倍						

## 殺虫剤

名称: ファイントリムDF  
種類: インドキサカルブ水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年5月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インドキサカルブを含む農薬の総使用回数
ピーマン	オオタバコガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
トマト	ハスモンヨトウ						
いちご	オオタバコガ						
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ	8～16倍	800mL/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
えだまめ	ハスモンヨトウ						
だいず	ハスモンヨトウ						
さといも	アワノメイガ	2000倍	100～300L/10a	収穫10日前まで	3回以内	散布	3回以内
しょうが							
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	2000倍	100～180L/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
たばこ	タバコアオムシ ヨトウムシ						
きく	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内