

殺菌剤

名称：アミスターオプティフロアブル

種類：アズキシストロビン・TPN水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	アズキシストロ ビンを含む農薬 の総使用回数	TPNを含む農 薬の総使用回数	
きゅうり	べと病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 灰色かび病 菌核病 黒星病	1000 倍	100～ 400L/10a	収穫前 日まで	4回 以内	散布	4回以内	14回以内(土壌灌 注は2回以内、散 布、常温煙霧、く ん煙及びエアゾル剤 の噴射は合計12 回以内)	
かぼちゃ	うどんこ病 べと病 疫病			収穫7 日前ま で	3回 以内			3回以内	
メロン	べと病 うどんこ病 つる枯病 菌核病			収穫3 日前ま で	4回 以内			5回以内	
すいか	炭疽病 つる枯病 うどんこ病 褐色腐敗病 菌核病								
トマト	疫病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病			収穫前 日まで	2回 以内			6回以内(土壌灌 注は2回以内、散 布、常温煙霧、く ん煙及びエアゾル剤 の噴射は合計4回 以内)	
ミニトマト	すすかび病 斑点病			収穫前 日まで					2回以内
なす	すすかび病 うどんこ病 褐色腐敗病 黒枯病 灰色かび病			収穫前 日まで	4回 以内			4回以内	4回以内
はくさい	べと病 白斑病 黒斑病 白さび病			収穫7 日前ま で	2回 以内				

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺菌剤

名称：アミスターオプティフロアブル

種類：アゾキシストロビン・TPN水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	アゾキシストロ ビンを含む農薬 の総使用回数	TPNを含む農薬 の総使用回数
にんじん	黒葉枯病 斑点病 菌核病 しみ腐病 うどんこ病	1000 倍	100～ 400L/10a	収穫 21日 前まで	2回 以内	散布	3回以内(粒剤は 1回以内、水和 剤は2回以内)	5回以内（種子へ の吹き付け処理は 1回以内）
たまねぎ	灰色かび病 べと病			収穫7 日前ま で	4回 以内		4回以内	6回以内
ねぎ	べと病 さび病 黒斑病 黄斑病 葉枯病 小菌核腐敗病			収穫 14日 前まで	3回 以内		5回以内（粒剤は 1回以内、水和 剤は4回以内 内）	4回以内(土壌灌注 は1回以内、散布 及び無人航空機散 布は合計3回以内)
にんにく	さび病 葉枯病			収穫7 日前ま で			3回以内	6回以内
だいこん	白さび病			収穫 45日 前まで			4回以内(粒剤は 1回以内、水和 剤は3回以内)	3回以内
ピーマン	斑点病 うどんこ病 黒枯病 炭疽病 灰色かび病 疫病			収穫前 日まで				
にがうり	うどんこ病			収穫7 日前ま で			3回以内	4回以内

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。