

殺虫剤

名称：アファームエクセラ顆粒水和剤

種類：エマメクチン安息香酸塩・ルフェスロン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024 年 2 月 28 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	エマメク チン安息 香酸塩を 含む農薬 の総使用 回数	ルフェス ロンを含 む農薬の 総使用回 数		
キャベツ	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ タマナギンウワバ	1000～ 1500 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前ま で	3 回 以内	散布	3 回以内	3 回以内		
	ネギアザミウマ シロイチモジヨトウ	1000 倍								
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ タマナギンウワバ シロイチモジヨトウ	12 倍	1.6L/10a						無人航空 機による 散布	
	24 倍	3.2L/10a								
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～ 1500 倍	100～ 300L/10a		3 回 以内	散布			無人航空 機による 散布	3 回以内
		8 倍	1.6L/10a							
		16 倍	3.2L/10a							
のぎわな チンゲンサ イ	コナガ	1000～ 1500 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日 前ま で	2 回 以内	散布	2 回以内			
	ハモグリバエ類	1000 倍								
こまつな	コナガ	1500 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前ま で	3 回 以内	散布	3 回以内			
みずな										
ブロッコリ ー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ	1000～ 1500 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前ま で	3 回 以内	無人航空 機による 散布	3 回以内			
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ	1000 倍								
		8 倍	1.6L/10a							
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ	16 倍	3.2L/10a							

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺虫剤

名称：アファームエクセラ顆粒水和剤

種類：エマメクチン安息香酸塩・ルフェスロン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時 期	本剤 の 使用 回数	使用方法	エマメ クチン 安息香 酸塩を 含む農 薬の総 使用回 数	ルフェ スロン を含む 農薬の 総使用 回数			
だいこん	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	1500 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日 前まで	3 回 以内	散布	3 回 以内	3 回 以内			
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000～ 1500 倍		収穫 7 日前ま で							
	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	1000 倍									
	シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	8 倍 16 倍	1.6L/10a 3.2L/10a								
非結球レタ ス	オオタバコガ	1000～ 1500 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日前ま で		3 回 以内			散布	3 回 以内	3 回 以内
	ナモグリバエ	1000 倍									
レタス	オオタバコガ	1000～ 1500 倍			1.6L/10a 3.2L/10a		無人航空 機による 散布				
	ナモグリバエ オオタバコガ ナモグリバエ	1000 倍 12 倍 24 倍									
ピーマン	ハスモンヨトウ オオタバコガ	1500 倍	100～ 300L/10a	収穫前 日まで	2 回 以内	散布	2 回以 内	4 回以 内			
トマト	オオタバコガ						5 回以 内	2 回以 内			
ミニトマト	ハモグリバエ類						2 回以 内	4 回以 内			
なす	オオタバコガ						2 回以 内	3 回以 内			
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ ウリノメイガ	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前 日まで	3 回 以内	散布	3 回以 内	3 回以 内			
すいか	ミナミキイロアザミウマ						2 回以 内	2 回以 内			
メロン	アザミウマ類 ウリノメイガ						12 倍 24 倍	1.6L/10a 3.2L/10a	収穫 14 日 前まで	2 回 以内	無人航空 機による 散布
かんしょ	ハスモンヨトウ	1000 倍	200～ 400L/10a	摘採 7 日前ま で	1 回	散布	1 回	1 回			
茶	チャハマキ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャトゲコナジラミ										

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。