

殺虫剤

名称：アファーム乳剤
種類：エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023 年 7 月 5 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エマメクチン安息香 酸塩を含む農薬の総 使用回数
みかん	アザミウマ類 ミカンハモグリガ	1000～ 2000 倍	200～ 700L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
未成熟 とうもろこし	ツマジロクサヨトウ						
とうもろこし (子実)	オオタバコガ ヨトウムシ			収穫 30 日前ま で			
飼料用とうもろこ し(子実)				収穫前日まで			
ヤングコーン				収穫 7 日前まで			
かんしょ	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日前まで	3 回以内	3 回以内	
えだまめ	ハスモンヨトウ			収穫 3 日前まで	2 回以内	2 回以内	
さやいんげん	ハモグリバエ類			収穫前日まで			
さやえんどう	ハスモンヨトウ			収穫 3 日前まで			
豆類(未成熟、た だし、さやいんげ んを除く)	ハモグリバエ類			2000 倍	コナジラミ類	3 回以内	3 回以内
すいか	アザミウマ類						
きゅうり	ウリノメイガ	2000 倍	コナジラミ類				
	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類						

殺虫剤

名称：アファーム乳剤
種類：エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023年7月5日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エマメクチン安息香 酸塩を含む農薬の総 使用回数	
ズッキーニ にがうり	オオタバコガ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
うり類 (漬物用)	ハスモンヨトウ ハダニ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類							
	アザミウマ類							
メロン	アザミウマ類	1000～2000 倍		ウリノメイガ ハモグリバエ類 コナジラミ類				
	ウリノメイガ ハモグリバエ類 コナジラミ類							
トマト ミニトマト	ハモグリバエ類 オオタバコガ トマトサビダニ コナジラミ類 トマトキバガ	2000 倍		収穫前日まで	5 回以内			5 回以内
なす	アザミウマ類 ハモグリバエ類 チャノホコリダニ ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ コナジラミ類			2 回以内	2 回以内			
ピーマン	オオタバコガ コナジラミ類							
とうがらし類	オオタバコガ		収穫 7 日前まで					

殺虫剤

名称：アファーム乳剤
種類：エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023 年 7 月 5 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エマメクチン安息 香酸塩を含む農薬 の総使用回数
キャベツ	コナガ	1000~	100~	収穫前日 まで	3 回以内	散布 無人航空機 による散布	3 回以内
	アオムシ	2000 倍	300L/10a				
	ヨトウムシ	4 倍	0.8L/10a				
	タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	8 倍 16 倍	1.6L/10a 3.2L/10a				
レタス	ハスモンヨトウ	1000~	100~	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布 無人航空機 による散布	3 回以内
	オオタバコガ	2000 倍	300L/10a				
	ナモグリバエ	4 倍	0.8L/10a				
		8 倍	1.6L/10a				
非結球レタス	ハスモンヨトウ	1000~	100~	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	オオタバコガ ナモグリバエ	2000 倍	300L/10a				
はくさい	コナガ	4 倍	0.8L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	無人航空機 による散布	3 回以内
	アオムシ	8 倍	1.6L/10a				
	ヨトウムシ	16 倍	3.2L/10a				
だいこん	コナガ	1000~	100~	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	アオムシ	2000 倍					
カリフラワー	ハイマダラノメイガ	2000 倍	300L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	コナガ	1000~					
	アオムシ アザミウマ類 オオタバコガ	2000 倍					

殺虫剤

名称：アファーム乳剤
種類：エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023 年 7 月 5 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エマメクチン安息 香酸塩を含む農薬 の総使用回数
ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ オオタバコガ	1000～ 2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	ハスモンヨトウ	2000 倍					
	コナガ アオムシ ヨトウムシ オオタバコガ ハスモンヨトウ	4 倍	0.8L/10a			無人航空機 による散布	
		8 倍	1.6L/10a				
		16 倍	3.2L/10a				
なばな類	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	1000～ 2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
のざわな	コナガ アオムシ			収穫 3 日前 まで	3 回以内		3 回以内
チンゲンサイ	コナガ アオムシ			収穫 7 日前 まで	1 回		1 回
パセリ	ハスモンヨトウ	2000 倍		収穫 3 日前 まで	2 回以内		2 回以内
こまつな	コナガ						

殺虫剤

名称：アファーム乳剤
種類：エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023 年 7 月 5 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	エマメクチン安息 香酸塩を含む農薬 の総使用回数
非結球あぶらな科 葉菜類（なばな 類、のざわな、チ ンゲンサイ、こま つなを除く）	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ類 ハイマダラノメイガ	1000～ 2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
	セルリー	ハモグリバエ類 オオタバコガ タバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ					
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000～ 2000 倍	1.6L/10a	無人航空 機による 散布	2 回以内	散布	2 回以内
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	1000 倍					
	ハモグリバエ類 アザミウマ類	8 倍					
わけぎ あさつき	シロイチモジヨトウ	1000～ 2000 倍	100～ 300L/10a	2 回以内	散布	2 回以内	
にら	アザミウマ類						
しゅんぎく	ハモグリバエ類 アザミウマ類 シロイチモジヨトウ	2000 倍	100～ 300L/10a	2 回以内	散布	2 回以内	
エンダイブ	オオタバコガ ハスモンヨトウ						

殺虫剤

名称：アファーム乳剤
種類：エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023 年 7 月 5 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エマメクチン安息香 酸塩を含む農薬の総 使用回数
すいぜんじな	タマナギンウワバ ハモグリバエ類 アザミウマ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
みつば	ハダニ類 キアゲハ ヨトウムシ ハスモンヨトウ			収穫 7 日前まで 但 し、伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで			
しそ	ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハダニ類 シソサビダニ			収穫 7 日前まで			
いちご	オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハダニ類			収穫前日まで			
オクラ	オオタバコガ						
アスパラガス	ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハダニ類						
ほうれんそう	ハスモンヨトウ ホウレンソウケナガ コナダニ			収穫 3 日前まで			
かぶ	コナガ						

殺虫剤

名称：アファーム乳剤
種類：エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023 年 7 月 5 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回 数	使用 方法	エマメクチン 安息香酸塩を 含む農薬の総 使用回数
トレビス	オオタバコガ	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3 回 以内	散布	3 回以内
非結球メ キャベツ	ハスモンヨトウ			収穫 7 日前まで			
にんじん	ハモグリバエ類 ホモノハダニ ハスモンヨトウ						
みょうが (花穂)	ハダニ類	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	2 回 以内	散布、但し花穂の発 生期にはマルチフィ ルム被覆により散布 液が直接花穂に飛散 しない状態で使用す る	2 回以内
みょうが (茎葉)				みょうが（花穂）の収穫 前日まで 但し、花穂を 収穫しない場合にあつて は開花期終了まで		散布	

殺虫剤

名称：アファーム乳剤
種類：エマメクチン安息香酸塩乳剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023 年 7 月 5 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エマメクチン安息香 酸塩を含む農薬の総 使用回数
エンサイ	ハスモンヨトウ	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
メキャベツ		1000 倍		収穫 3 日前まで	3 回以内		3 回以内
葉しょうが		2000 倍		収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内
かぼちゃ	収穫前日まで						
食用ぎく	アザミウマ類			収穫 14 日前まで	1 回		1 回
モロヘイヤ	ハスモンヨトウ			収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
茶	チャノコカクモンハマキ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノホソガ チャハマキ	1000～ 2000 倍	200～ 400L/10a	摘採 7 日前まで	1 回		1 回
	チャノホコリダニ ハスモンヨトウ	2000 倍					
きく	アザミウマ類	1000～	100～ 300L/10a	発生初期	5 回以内		5 回以内
ストック	コナガ	2000 倍					
マーガレット	ハスモンヨトウ	2000 倍					
花き類・観葉植物	オオタバコガ ハモグリバエ類 ヨトウムシ類	1000 倍					
	アザミウマ類	2000 倍					