

## 殺菌剤

名称：アミスター10フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022年11月9日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	アゾキシ ストロビ ンを含む 農薬の総 使用回数				
なし	黒星病 黒斑病 輪紋病	1000~1500倍	200~700L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内				
	うどんこ病 炭疽病										
ぶどう	黒とう病 灰色かび病 べと病 枝膨病 晩腐病 褐斑病 さび病	1000倍		収穫30日前まで	3回以内						
	アセロラ			炭疽病					収穫3日前まで		
おうとう	灰星病 褐色せん孔病 炭疽病			収穫前日まで							
もも	炭疽病 灰星病 黒星病 ホモブシス腐敗病				収穫前日まで						
	ネクタリン			灰星病 黒星病 炭疽病 ホモブシス腐敗病							
パッション フルーツ	円斑病 疫病										

## 殺菌剤

名称：アミスター10フロアブル  
種類：アゾキシストロピン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022年11月9日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	アゾキシ ストロピ ンを含む 農薬の総 使用回数
かき	うどんこ病 落葉病	1000 倍	200~700L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
かき (葉)	炭疽病 黒点病 すす点病			収穫 21 日前まで			
りんご(ふじ、 玉林、ジョナゴ ールド、つが る、千秋、さん さ、紅玉、シナ ノスイート、昴 林、涼香の季 節)	うどんこ病			収穫 45 日前まで			
いちじく	そうか病 疫病 黒葉枯病 さび病			収穫前日まで			
すもも	灰星病 すす点病						
びわ	炭疽病	10 倍	4L/10a	収穫 7 日 前まで		無人 航空 機に よる 散布	

## 殺菌剤

名称：アミスター10フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022年11月9日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	アゾキシ ストロビ ンを含む 農薬の総 使用回数
うめ	黒星病 すす斑病	1500 倍	200~700L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内
マンゴー	炭疽病	1000 倍		収穫 7 日前まで	1 回		1 回
グアバ (果実)				収穫 30 日前まで	3 回以内		3 回以内
オリーブ オリーブ (葉)				収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内
バナナ				収穫 7 日前まで	3 回以内		3 回以内
ピタヤ	炭腐病			収穫前日まで	3 回以内		