

殺菌剤

名称: アミスター20フロアブル
種類: アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年9月29日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病	原液	4~8mL/ 乾燥種子 1kg	は種前	1回	種子吹き付け 処理	4回以内(種子への 処理は1回以内、は 種後は3回以内)
	株腐病		8mL/ 乾燥種子 1kg			塗沫処理	
	うどんこ病 赤さび病	2000~3000 倍	100~200L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	
だいず	紫斑病	16~24倍	100~300L/10a		2回以内	無人航空機に よる散布	2回以内
	腐敗粒	2000倍	100~300L/10a	3回以内			
えだまめ	べと病				収穫前日 まで		
あずき	炭疽病 さび病				60~200L/10a	収穫7日前 まで	3回以内
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病 角斑病 炭疽病	収穫前日 まで					
さやいんげん	灰色かび病 菌核病 角斑病						
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病	1500~2000 倍	100~300L/10a	収穫前日 まで	4回以内	4回以内	
未成熟 そらまめ	さび病						収穫3日前 まで
きゅうり	うどんこ病 べと病	1500~2000 倍	100~300L/10a	収穫前日 まで	4回以内	4回以内	
	灰色かび病 菌核病	1500倍					
	褐斑病 炭疽病	2000倍					
にがうり	うどんこ病 べと病 炭疽病	2000倍	1500~2000 倍	収穫7日前 まで	3回以内	3回以内	
うり類 (漬物用)	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病	4回以内			4回以内		

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを 含む農薬の 総使用回数
メロン	うどんこ病 つる枯病 べと病	2000 倍	100~300L/10a	収穫前日 まで	4 回以内	散布	4 回以内
すいか	つる枯病 炭疽病						
ズッキーニ	うどんこ病						
トマト	葉かび病 灰色かび病						
なす	うどんこ病 すすかび病 褐色斑点病						
ピーマン	灰色かび病						
葉たまねぎ	灰色腐敗病 べと病	16 倍	1.6L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	無人航空機に よる散布	4 回以内 (粒剤は 3 回以内)
たまねぎ	灰色腐敗病 べと病 灰色かび病			収穫前日 まで	4 回以内		4 回以内
ねぎ	べと病 黄斑病 黒斑病 リゾクトニア葉鞘腐 敗病	16 倍	1.6L/10a	収穫 3 日前 まで	4 回以内	無人航空機に よる散布	5 回以内(粒剤は 1 回以内、水和剤は 4 回以内)
	さび病 葉枯病						
わけぎ	さび病 べと病 黄斑病 黒斑病	2000 倍	100~300L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	4 回以内
あさつき				収穫 3 日前 まで			
にら				収穫 14 日 前まで			
にら(花茎)	白斑葉枯病			収穫前日 まで			2 回以内
にんにく	さび病	20 倍	1.6L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	無人航空機に よる散布	3 回以内
	葉枯病	2000 倍	100~300L/10a			散布	
らっきょう	さび病			収穫 3 日前 まで			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数											
レタス	菌核病 灰色かび病 べと病 すそ枯病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内(土壌灌注 は 2 回以内)											
	ビッグベイン病		1.5～3L/m ²	収穫 30 日 前まで	2 回以内	土壌灌注												
非結球レタス	菌核病 灰色かび病 べと病		100～300L/10a	100～300L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内										
はくさい	べと病 黒斑病 白さび病	2000～3000 倍																
	白斑病																	
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病	2000 倍	100～300L/10a						収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内						
ブロッコリー	べと病 黒すす病												収穫 3 日前 まで	3 回以内	3 回以内			
非結球あぶら な科葉菜類 (こまつな、チ ンゲンサイ、タ アサイ、みず なを除く)	白さび病												2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
チンゲンサイ タアサイ みずな																		
かぶ	白斑病												2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	3 回以内(粒剤は 1 回以内、水和剤は 2 回以内)
こまつな	白さび病 白斑病																	
畑わさび	白さび病												2000 倍	100～300L/10a	畑育苗期	2 回以内	散布	2 回以内
わさび																		
だいこん	ワッカ症			2000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布					4 回以内(粒剤は 1 回 以内、水和剤は 3 回 以内)					
バジル	べと病					収穫前日ま で	2 回以内						2 回以内					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
いちご	うどんこ病	1500～2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	苗床:4回以内 本圃:3回以内	散布	8回以内(苗床では4回以内、本圃での土壌混和は1回以内、本圃での散布は3回以内)
	炭疽病	2000倍					
	灰色かび病	1500倍					
	うどんこ病	1500～2000倍		親株育成期	3回以内		
	炭疽病	2000倍					
	灰色かび病	1500倍					
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000倍	収穫前日まで			4回以内	4回以内(粒剤は3回以内)
てんさい	葉腐病 褐斑病	1500倍	ペーパーポット 1冊当り1L (3L/m ²)	収穫14日前まで	3回以内	苗床灌注	4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内)
	根腐病	1500～4000倍					
		500倍		定植前	1回		
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症(輪斑病菌による) もち病	2000倍	100～400L/10a	摘採14日前まで	3回以内	散布	3回以内
みしまさいこ	炭疽病			収穫21日前まで	4回以内		4回以内
エンダイブ	菌核病 すそ枯病				1回		
パセリ	うどんこ病			収穫45日前まで	1回		4回以内(粒剤は3回以内、水和剤は1回以内)
みつば	灰色かび病			収穫14日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで			1回

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを 含む農薬の 総使用回数			
みょうが (花穂)	紋枯病	2000 倍	3L/m ²	収穫 3 日前 まで	2 回以内	土壌灌注	4 回以内(粒剤は 2 回 以内、水和剤は 2 回 以内)			
みょうが (茎葉)				みょうが(花 穂)の収穫 3 日前まで 但し、花穂 を収穫しな い場合に あつては開 花期終了 まで						
しそ	斑点病 さび病		収穫前日 まで	100~300L/10a	2 回以内		散布	2 回以内		
せり	葉枯病		収穫 7 日前 まで					4 回以内		
クレソン	斑点病		収穫 21 日 前まで					3 回以内		
葉ごぼう	うどんこ病		収穫前日 まで					1 回		
オクラ								6 回以内(全面土壌混 和は 1 回以内、散布 は 2 回以内、株元散 布は 3 回以内)		
こおにたびらこ ははこぐさ	菌核病		収穫 30 日 前まで					1 回		
セルリー	斑点病		収穫 3 日前 まで					4 回以内		
モロヘイヤ	灰色かび病 黒星病		収穫前日 まで							
ばれいしょ	疫病 夏疫病	3000~4000 倍	20L/10a			収穫 7 日前 まで		3 回以内	植溝内土壌 散布	5 回以内(種いもへの 処理は 1 回以内、植 付時の土壌散布は 1 回以内、散布は 3 回 以内)
	銀か病	100 倍	10~20L/10a			植付時		1 回		
	黒あざ病	100~200 倍	20L/10a							
		500 倍	—	植付前	種いも瞬間浸 漬					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
やまのいも	炭疽病	2000 倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	4 回以内(粒剤は 1 回以内、水和剤は 3 回以内)
	葉渋病	32 倍	3.2L/10a			無人航空機による散布	
さといも	疫病	2000 倍	100~300L/10a	収穫 14 日前まで		散布	3 回以内
		18 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
かんしょ	基腐病	2000 倍	100~300L/10a	収穫 14 日前まで		散布	
		32 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
せんぶり	さび病	2000 倍	100~300L/10a	収穫 7 日前まで		散布	2 回以内
しゅんぎく	炭疽病			収穫前日まで			
きく	白さび病			発病初期			5 回以内
食用ぎく				収穫前日まで			2 回以内
たばこ	赤星病	2000~3000 倍	100~180L/10a	収穫 10 日前まで	2 回以内		2 回以内(粒剤は 1 回以内、水和剤は 2 回以内)
	菌核病						
とうき	斑点病	2000 倍	100~300L/10a	収穫 30 日前まで	3 回以内		3 回以内
とうき(葉)				収穫 3 日前まで			