

殺菌剤

名称：アミスター20フロアブル

種類：アズキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024年5月15日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アズキシストロビンを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病	原液	4~8mL /乾燥種子 1kg	は種前	1回	種子吹き付け処理	4回以内（種子への処理は1回以内、は種後は3回以内）
	株腐病		8mL /乾燥種子 1kg			塗沫処理	
	黄斑病	2000倍	100~200L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	
	うどんこ病 赤さび病	2000~3000倍					
だいず	紫斑病	16~24倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内
	腐敗粒	2000倍	100~300L/10a				
	べと病						
えだまめ				収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
あずき	炭疽病 さび病	2000倍	60~200L/10a	収穫7日前まで			
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病 角斑病 炭疽病						
さやいんげん	灰色かび病 菌核病 角斑病	2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで			
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病						
未成熟そらまめ	さび病						
きゅうり	うどんこ病 べと病	1500~2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
	灰色かび病 菌核病	1500倍					
	褐斑病 炭疽病	2000倍					
にがうり	うどんこ病 べと病 炭疽病	2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
うり類（漬物用）	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病	1500~2000倍		収穫7日前まで	4回以内		4回以内

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺菌剤

名称：アミスター20フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アゾキシス トロビンを 含む農薬の 総使用回数
メロン	うどんこ病 つる枯病 べと病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	4 回以内	散布	4 回以内
すいか	つる枯病 炭疽病						
ズッキーニ	うどんこ病						
トマト	葉かび病 灰色かび病						
なす	うどんこ病 すすかび病 褐色斑点病						
ピーマン	灰色かび病						
葉たまねぎ	灰色腐敗病 べと病	16 倍	1.6L/10a	収穫 3 日 前まで	3 回以内	無人航空 機による 散布	4 回以内 (粒剤は 3 回以内)
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病			べと病	収穫前日 まで		4 回以内
	ねぎ						
ねぎ	さび病 葉枯病 べと病	16 倍	1.6L/10a	無人航空 機による 散布	4 回以内		
わけぎ	さび病 べと病 黄斑病 黒斑病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	4 回以内
あさつき				収穫 3 日 前まで			
にら				収穫 14 日 前まで			
にら(花茎)	白斑葉枯病			収穫前日 まで			2 回以内
にんにく	さび病	20 倍	1.6L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	無人航空 機による 散布	3 回以内
	葉枯病	2000 倍	100～ 300L/10a			散布	
らっきょう	さび病			収穫 3 日 前まで			

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺菌剤

名称：アミスター20フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
レタス	菌核病 すそ枯病 灰色かび病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内（土壌 灌注は 2 回以 内）
	べと病	16 倍	1.6L/10a				
	ビッグベイン 病		1.5～3L/ ㎡	収穫 30 日 前まで	2 回以内	土壌灌注	
非結球レタ ス	菌核病 灰色かび病 べと病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内
くきちしゃ	灰色かび病			収穫 3 日前 まで			2 回以内
はくさい	べと病	16 倍	1.6L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	無人航空機に よる散布	4 回以内
	黒斑病 白さび病	2000 倍					
	白斑病	2000～3000 倍					
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病						
ブロッコリ ー	べと病 黒すす病 菌核病			収穫前日ま で	3 回以内		4 回以内（粒剤 は 1 回以内、水 和剤は 3 回以 内）
非結球あぶ らな科葉菜 類（こまつ な、チンゲ ンサイ、タ アサイ、み ずなを除 く）	白さび病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
チンゲンサ イ タアサイ みずな							3 回以内（粒剤 は 1 回以内、水 和剤は 2 回以 内）
かぶ							白斑病

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺菌剤

名称：アミスター20フロアブル

種類：アズキシストロビン水和剤

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方 法	アズキシス トロビンを 含む農薬の 総使用回数		
こまつな	白さび病 白斑病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	3 回以内 (粒剤は 1 回 以内、水和 剤は 2 回以 内)		
畑わさび わさび				畑育苗期			2 回以内		
だいこん	白さび病	16 倍	1.6L/10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	無人航 空機に よる散 布	4 回以内(粒 剤は 1 回以 内、水和剤 は 3 回以内)		
	ワッカ症	2000 倍							
バジル	べと病			収穫前日 まで	2 回以内		2 回以内		
いちご	うどんこ病	1500～2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	苗床：4 回以内 本圃：3 回以内	散布	8 回以内 (苗床では 4 回以内、本 圃での土壌 混和は 1 回 以内、本圃 での散布は 3 回以内)		
	炭疽病	2000 倍							
	灰色かび病	1500 倍							
	うどんこ病	1500～2000 倍		親株 育成期	3 回以内				
	炭疽病	2000 倍							
灰色かび病	1500 倍								
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000 倍		収穫前日 まで	4 回以内		4 回以内 (粒剤は 3 回 以内)		
てんさい	葉腐病 褐斑病	1500 倍		収穫 14 日 前まで	3 回以内		4 回以内 (灌注は 1 回 以内、散布 は 3 回以 内)		
	根腐病	1500～4000 倍							
		根腐病	500 倍	ペーパー ポット 1 冊当り 1L (3L/m ²)	定植前	1 回	苗床灌 注		
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 (輪斑病菌に よる) もち病	2000 倍	100～ 400L/10a	摘採 14 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内		
みしまさいこ	炭疽病								4 回以内
エンダイブ	菌核病 すそ枯病							100～ 300L/10a	収穫 21 日 前まで

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺菌剤

名称：アミスター20フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
パセリ	うどんこ病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 45 日前まで	1 回	散布	4 回以内 (粒剤は 3 回以内、水和剤は 1 回以内)
みつば	灰色かび病			収穫 14 日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで			1 回
みょうが (花穂)	紋枯病		3L/m ²	収穫 3 日前まで	2 回以内	土壌灌注	4 回以内 (粒剤は 2 回以内、水和剤は 2 回以内)
みょうが (茎葉)				みょうが (花穂) の収穫 3 日前まで 但し、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで			
しそ	斑点病 さび病		100～300L/10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	2 回以内
せり	葉枯病			収穫 7 日前まで			5 回以内 (粒剤は 1 回以内、水和剤は 4 回以内)
クレソン	斑点病			収穫 21 日前まで			3 回以内
葉ごぼう	うどんこ病			100～300L/10a	収穫前日まで	1 回	3 回以内
オクラ						2 回以内	6 回以内 (全面土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内、株元散布は 3 回以内)
こおにたびらこ ははこぐさ	菌核病			収穫 30 日前まで	1 回	1 回	
セルリー	斑点病			収穫 3 日前まで	4 回以内	4 回以内	
モロヘイヤ	灰色かび病 黒星病		収穫前日まで				

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺菌剤

名称：アミスター20フロアブル

種類：アズキシストロビン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アズキシストロビンを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病 夏疫病	3000～ 4000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前ま で	3 回以内	散布	5 回以内 (種いもへ の処理は 1 回以内、植 付時の土壌 散布は 1 回 以内、散布 は 3 回以 内)
	銀か病	100 倍	20L/10a	植付時	1 回	植溝内土壌 散布	
	黒あざ病		10～ 20L/10a				
			100～200 倍	20L/10a			
		500 倍	—	植付前		種いも瞬間 浸漬	
やまのいも	炭疽病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	4 回以内 (粒剤は 1 回 以内、水和 剤は 3 回以 内)
	葉渋病	32 倍	3.2L/10a			無人航空機 による散布	
さといも	疫病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
		18 倍	1.6L/10a			無人航空機 による散布	
かんしょ	基腐病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
		12～32 倍	1.6L/10a			無人航空機 による散布	
せんぶり	さび病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前ま で	2 回以内	散布	2 回以内(粒 剤は 1 回以 内、水和剤 は 2 回以内)
しゅんぎく	炭疽病			収穫前日まで			
きく	白さび病			発病初期			
食用ぎく				収穫前日まで			
トルコギキョウ	斑点病			発病前～発病 初期			
たばこ	赤星病	2000～ 3000 倍	100～ 180L/10a	収穫 10 日前 まで	2 回 以内	散布	
	菌核病						
とうき	斑点病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 30 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
とうき (葉)				収穫 3 日前ま で			
食用ミニバラ	うどんこ 病	2000 倍		収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内
つるむらさき	紫斑病						

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。