殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法 2026 年 7 月 22 日現在

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病	原液	4～8mL /乾燥種子 1kg	は種前	1 回	種子吹き付け処理	4 回以内（種子への処理は 1 回以内、は種後は 3 回以内）
	株腐病		8mL /乾燥種子 1kg			塗沫処理	
	黄斑病	2000 倍	100～ 200L/10a	収穫 7 日前まで	3 回 以内	散布	
	うどんこ病	2000～3000 倍					
	赤さび病	16 倍	0.8L/10a			無人航空機による散布	
だいず	紫斑病	2000～3000 倍	100～ 300L/10a		2 回 以内	散布	2 回以内
		16～24 倍	0.8L/10a			無人航空機による散布	
	腐敗粒	2000 倍	100～ 300L/10a			散布	
	べと病						
えだまめ				収穫前日まで	3 回 以内		3 回以内
あずき	炭疽病 さび病		60～ 200L/10a	収穫 7 日前まで			
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病 角斑病 炭疽病						
さやいんげん	灰色かび病 菌核病 角斑病		100～ 300L/10a	収穫前日まで			
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病						
未成熟そらまめ	さび病			収穫 3 日前まで			
きゅうり	うどんこ病 べと病	1500～2000 倍		収穫前日まで	4 回 以内		4 回以内
	灰色かび病 菌核病	1500 倍					
	褐斑病 炭疽病	2000 倍					
にがうり	うどんこ病 べと病 炭疽病			収穫 7 日前まで	3 回 以内		3 回以内

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社 東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
うり類（漬物用）	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病	1500～ 2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	4 回以内	散布	4 回以内
メロン	うどんこ病 つる枯病 べと病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	4 回以内	散布	4 回以内
すいか	つる枯病 炭疽病						
ズッキーニ	うどんこ病						
トマト	葉かび病 灰色かび病						
なす	うどんこ病 すすかび病 褐色斑点病						
ピーマン	灰色かび病						4 回以内(粒剤は 3 回以内)
葉たまねぎ	灰色腐敗病 べと病 灰色かび病 小菌核病			収穫 3 日 前まで	3 回以内		3 回以内
たまねぎ	灰色腐敗病 灰色かび病 小菌核病			収穫前日 まで	4 回以内		4 回以内
	べと病	16 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
ねぎ	黄斑病 黒斑病 リゾクトニア葉鞘腐敗病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日 前まで		散布	5 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 4 回以内）
	さび病 葉枯病 べと病	16 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
わけぎ	さび病 べと病 黄斑病 黒斑病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで		散布	4 回以内
あさつき				収穫 3 日 前まで			
にら	白斑葉枯病			収穫 14 日 前まで	2 回以内		2 回以内
にら(花茎)				収穫前日 まで			

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
にんにく	さび病	20 倍	1.6L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	無人航空機による散布	3 回以内
	葉枯病	2000 倍	100～300L/10a			散布	
らっきょう	さび病			収穫 3 日前まで			
		16 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
レタス	菌核病 すそ枯病 灰色かび病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	4 回以内	散布	4 回以内（土壌灌注は 2 回以内）
	べと病	16 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
	ビッグベイン病	2000 倍	1.5～3L/㎡	収穫 30 日前まで	2 回以内	土壌灌注	
非結球レタス	菌核病 灰色かび病 べと病		100～300L/10a	収穫 7 日前まで	4 回以内	散布	4 回以内
くきちしゃ	灰色かび病			収穫 3 日前まで	2 回以内		2 回以内
はくさい	べと病	16 倍	1.6L/10a	収穫前日まで	4 回以内	無人航空機による散布	5 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 4 回以内）
	黒斑病 白さび病	2000 倍	100～300L/10a			散布	
	白斑病	2000～3000 倍					
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病 べと病	2000 倍					
ブロッコリー	べと病 黒すす病 菌核病			収穫前日まで	3 回以内		4 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 3 回以内）
結球あぶらな科葉菜類（はくさい、キャベツを除く）	黒斑病 べと病			収穫前日まで　但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで	4 回以内		5 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 4 回以内）

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、みずなを除く）	白さび病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
チンゲンサイ タアサイ みずな	白さび病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	3 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 2 回以内）
かぶ	白斑病						
こまつな	白さび病 白斑病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	3 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 2 回以内）
畑わさび	白さび病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
わさび				畑育苗期			
だいこん	白さび病	16 倍	1.6L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	無人航空機による散布	4 回以内(粒剤は 1 回以内、水和剤は 3 回以内)
	ワッカ症	2000 倍	100～300L/10a			散布	
バジル	べと病			収穫前日まで	2 回以内		2 回以内
いちご	うどんこ病	1500～2000 倍		収穫前日まで	苗床：4 回以内 本圃：3 回以内		8 回以内（苗床では 4 回以内、本圃での土壌混和は 1 回以内、本圃での散布は 3 回以内）
	炭疽病	2000 倍					
	灰色かび病	1500 倍					
	うどんこ病	1500～2000 倍		親株 育成期	3 回以内		
	炭疽病	2000 倍					
	灰色かび病	1500 倍					
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000 倍		収穫前日まで	4 回以内		4 回以内（粒剤は 3 回以内）
てんさい	葉腐病 褐斑病	1500 倍		収穫 14 日前まで	3 回以内		4 回以内（灌注は 1 回以内、散布は 3 回以内）
	根腐病	1500～4000 倍					
		500 倍	ペーパーポット 1 冊当り 1L（3L/㎡）	定植前	1 回	苗床灌注	

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 （輪斑病菌による） もち病	2000 倍	100～ 400L/10a	摘採 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
みしまさいこ	炭疽病 斑点病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 21 日前まで	4 回以内	散布	4 回以内
エンダイブ	菌核病 すそ枯病				1 回		1 回
パセリ	うどんこ病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日前まで	1 回	散布	4 回以内(粒剤は 3 回以内、水和剤は 1 回以内)
みつば	灰色かび病			収穫 14 日前まで　但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで			1 回
みょうが（花穂）	紋枯病		3L/㎡	収穫 3 日前まで	2 回以内	土壌灌注	4 回以内(粒剤は 2 回以内、水和剤は 2 回以内)
みょうが（茎葉）				みょうが（花穂）の収穫 3 日前まで　但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで			
しそ	斑点病 さび病		100～ 300L/10a	収穫前日まで		散布	2 回以内
せり	葉枯病			収穫 7 日前まで	4 回以内		5 回以内(粒剤は 1 回以内、水和剤は 4 回以内)
クレソン	斑点病			収穫 21 日前まで	3 回以内		3 回以内
葉ごぼう	うどんこ病				1 回		1 回
オクラ				収穫前日まで	2 回以内		6 回以内(全面土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内、株元散布は 3 回以内)
こおにたびらこ ははこぐさ	菌核病			収穫 30 日前まで	1 回		1 回

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
セルリー	斑点病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 3 日前まで	4 回以内	散布	5 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 4 回以内）
モロヘイヤ	灰色かび病 黒星病			収穫前日まで			4 回以内
ばれいしょ	疫病 夏疫病	3000～4000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	5 回以内（種いもへの処理は 1 回以内、植付時の土壌散布は 1 回以内、散布は 3 回以内）
	銀か病	100 倍	20L/10a	植付時	1 回	植溝内土壌散布	
	黒あざ病		10～20L/10a				
		100～200 倍	20L/10a				
		500 倍	－	植付前		種いも瞬間浸漬	
やまのいも	炭疽病	2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	4 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 3 回以内）
	葉渋病	32 倍	3.2L/10a			無人航空機による散布	
さといも	疫病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで		散布	3 回以内
		18 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
かんしょ	基腐病	2000 倍	100～300L/10a			散布	
		12～32 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
せんぶり	さび病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで		散布	
しゅんぎく	炭疽病			収穫前日まで	2 回以内		2 回以内
きく	白さび病			発病初期	5 回以内		5 回以内
食用ぎく				収穫前日まで	2 回以内		2 回以内
トルコギキョウ	斑点病			発病前~発病初期	5 回以内		5 回以内
たばこ	赤星病	2000～3000 倍	100～180L/10a	収穫 10 日前まで	2 回以内		2 回以内(粒剤は 1 回以内、水和剤は 2 回以内)
	菌核病	2000 倍					

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
とうき	斑点病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 30 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
とうき（葉）				収穫 3 日前まで			
食用ミニバラ	うどんこ病	2000 倍		収穫前日まで	2 回以内		2 回以内
つるむらさき	紫斑病						
しょくようほおずき	すす斑病	2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号