

## 殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 5 月 11 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病	原液	4~8mL/乾燥種子 1kg	は種前	1 回	種子吹き付け処理	4 回以内（種子への処理は 1 回以内、は種後は 3 回以内）
	株腐病		8mL/乾燥種子 1kg			塗沫処理	
	うどんこ病 赤さび病	2000~3000 倍	100~200L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	
だいず	紫斑病		100~300L/10a				2 回以内
	腐敗粒	800mL/10a	収穫前日まで				
	べと病			100~300L/10a			
えだまめ							
あずき	炭疽病 さび病						
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病 角斑病 炭疽病	2000 倍	60~200L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病						

## 殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 5 月 11 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
未成熟そらまめ	さび病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 3 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
きゅうり	うどんこ病 べと病	1500～2000 倍		収穫前日まで	4 回以内		4 回以内
	灰色かび病 菌核病	1500 倍					
	褐斑病 炭疽病	2000 倍					
にがうり	うどんこ病 べと病 炭疽病			3 回以内	3 回以内		
うり類（漬物用）	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病	1500～2000 倍	収穫 7 日前まで	4 回以内	4 回以内		
メロン	うどんこ病 つる枯病 べと病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内
すいか	つる枯病 炭疽病						
ズッキーニ	うどんこ病						
トマト	葉かび病 灰色かび病						
なす	うどんこ病 すすかび病 褐色斑点病						

## 殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 5 月 11 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
ピーマン	灰色かび病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	4 回以内(粒剤は 3 回以内)
葉たまねぎ	灰色腐敗病 べと病			収穫 3 日前まで	3 回以内		3 回以内
たまねぎ	灰色腐敗病 べと病 灰色かび病			収穫前日まで	4 回以内		4 回以内
ねぎ	べと病 黄斑病 黒斑病 リゾクトニア 葉鞘腐敗病	16 倍	1.6L/10a	収穫 3 日前まで		無人航空機による散布	5 回以内(粒剤は 1 回以内、水和剤は 4 回以内)
	さび病 葉枯病						
わけぎ	さび病 べと病 黄斑病 黒斑病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前まで	散布	4 回以内	
あさつき				収穫 3 日前まで			
にら	白斑葉枯病			収穫 14 日前まで			2 回以内
にら(花茎)		収穫前日まで					

## 殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 5 月 11 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
にんにく	さび病	20 倍	1.6L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	無人航空機 による散布	3 回以内
	葉枯病	2000 倍	100～ 300L/10a			収穫 3 日前 まで	
らっきょう	さび病			散布			
レタス	菌核病 灰色かび病 べと病 すそ枯病		2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布
	ビッグベ イン病	1.5～3L/m <sup>2</sup>		収穫 30 日前 まで	2 回以内	土壌灌注	
非結球レタス	菌核病 灰色かび病 べと病	2000～3000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内
はくさい	べと病 黒斑病 白さび病		100～ 300L/10a				
	白斑病	2000 倍		菌核病 株腐病 黒斑病			
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病		2000 倍		100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内
ブロッコリー	べと病 黒すす病	2000 倍		100～ 300L/10a			

## 殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 5 月 11 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
非結球あぶらな科 葉菜類（こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、みずなを除く）	白さび病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
チンゲンサイ タアサイ みずな							3 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤 は 2 回以内）
かぶ	白斑病						
こまつな	白さび病 白斑病			2 回以内			
畑わさび	白さび病						
わさび				畑育苗期	3 回以内		
だいこん	ワッカ症			収穫 14 日前 まで			2 回以内
				バジル	べと病		

## 殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 5 月 11 日現在

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アゾキシストロ ビンを含む農薬 の総使用回数
いちご	うどんこ病	1500~2000 倍	100~ 300L/10a	収穫前日まで	苗床：4回以 内 本圃：3回以 内	散布	8回以内（苗床 では4回以内、 本圃での土壌混 和は1回以内、 本圃での散布は 3回以内）
	炭疽病	2000倍					
	灰色かび病	1500倍					
	うどんこ病	1500~2000 倍		親株 育成期	3回以内		
	炭疽病	2000倍					
	灰色かび病	1500倍					
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000倍	収穫前日まで	4回以内	4回以内（粒剤 は3回以内）		
	てんさい	葉腐病 褐斑病				1500倍	収穫14日前 まで
根腐病		1500~4000 倍	定植前	1回	苗床灌注		
		500倍				ペーパーポ ット1冊当 り1L (3L/ m <sup>2</sup> )	
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症（輪斑 病菌による） もち病	2000倍	100~ 400L/10a	摘採14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	みしまさいこ						
エンダイブ	菌核病 すそ枯病				1回		1回

## 殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 5 月 11 日現在

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アゾキシスト ロビンを含む 農薬の総使用 回数
パセリ	うどんこ病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 45 日前まで	1 回	散布	4 回以内(粒剤 は 3 回以内、 水和剤は 1 回 以内)
みつば	灰色かび病			収穫 14 日前まで 但し、伏せ込み栽 培は伏せ込み前ま で			1 回
みょうが(花 穂)	紋枯病	2000 倍	3L/m <sup>2</sup>	収穫 3 日前まで	2 回以内	土壌灌注	4 回以内(粒剤 は 2 回以内、 水和剤は 2 回 以内)
みょうが(茎 葉)				みょうが(花穂) の収穫 3 日前まで 但し、花穂を収穫 しない場合にあつ ては開花期終了ま で			
しそ	斑点病 さび病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	4 回以内	散布	2 回以内
せり	葉枯病			収穫 7 日前まで			5 回以内(粒剤 は 1 回以内、 水和剤は 4 回 以内)
クレソン	斑点病			収穫 21 日前まで	3 回以内	3 回以内	
葉ごぼう	うどんこ病			1 回	1 回	1 回	

## 殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 5 月 11 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	
オクラ	うどんこ病	2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	6 回以内(全面土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内、株元散布は 3 回以内)	
こおにたびらこ ははこぐさ	菌核病			収穫 30 日前まで	1 回			1 回
セルリー	斑点病			収穫 3 日前まで	4 回以内			4 回以内
モロヘイヤ	灰色かび病 黒星病			収穫前日まで				
ばれいしょ	疫病 夏疫病	3000～4000 倍	20L/10a 10～20L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	植溝内土壌散布 種いも瞬間浸漬	5 回以内(種いもへの処理は 1 回以内、植付時の土壌散布は 1 回以内、散布は 3 回以内)	
	銀か病	100 倍		植付時	1 回			
	黒あざ病	100～200 倍	20L/10a	植付前				
		500 倍	—					



## 殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル  
種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	
やまのいも	炭疽病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	4 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 3 回以内）	
	葉渋病	32 倍	3.2L/10a			無人航空機による散布		
さといも	疫病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日前まで		散布	3 回以内	
		18 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布		
かんしょ	基腐病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 14 日前まで		散布		
		12～32 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布		
せんぶり	さび病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前まで		散布	2 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 2 回以内）	
しゅんぎく	炭疽病			収穫前日まで				2 回以内
きく	白さび病			発病初期				5 回以内
食用ぎく				収穫前日まで				2 回以内
たばこ	赤星病	2000～3000 倍	100～ 180L/10a	収穫 10 日前まで	2 回以内			散布
	菌核病	2000 倍						
とうき	斑点病		収穫 3 日前まで	3 回以内				
とうき（葉）								