殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法 2023 年 12 月 6 日現在

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用
病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の
使用回
数</th><th>使用方法</th><th>アゾキシスト
ロビンを含む
農薬の総使用
回数</th></tr>
<tr><td rowspan="4">小麦</td><td>紅色雪腐病</td><td rowspan="2">原液</td><td>4～8mL/乾
燥種子 1kg</td><td rowspan="2">は種前</td><td rowspan="2">1 回</td><td>種子吹き付
け処理</td><td rowspan="4">4 回以内（種子
への処理は 1
回以内、は種
後は 3 回以
内）</td></tr>
<tr><td>株腐病</td><td>8mL/乾燥種
子 1kg</td><td>塗沫処理</td></tr>
<tr><td>黄斑病</td><td>2000 倍</td><td rowspan="2">100～
200L/10a</td><td rowspan="6">収穫 7 日
前まで</td><td rowspan="2">3 回以内</td><td rowspan="4">散布</td></tr>
<tr><td>うどんこ病
赤さび病</td><td rowspan="2">2000～
3000 倍</td></tr>
<tr><td rowspan="4">だいず</td><td rowspan="3">紫斑病</td><td>100～
300L/10a</td><td rowspan="4">2 回以内</td><td rowspan="4">2 回以内</td></tr>
<tr><td>16～24 倍</td><td>800mL/10a</td><td>無人航空機
による散布</td></tr>
<tr><td>腐敗粒</td><td rowspan="7">2000 倍</td><td rowspan="3">100～
300L/10a</td><td rowspan="15">散布</td></tr>
<tr><td>べと病</td></tr>
<tr><td>えだまめ</td><td>収穫前日
まで</td><td rowspan="6">3 回以内</td><td rowspan="6">3 回以内</td></tr>
<tr><td>あずき</td><td>炭疽病
さび病</td><td rowspan="2">60～
200L/10a</td><td rowspan="2">収穫 7 日
前まで</td></tr>
<tr><td>いんげんまめ</td><td>灰色かび病
菌核病
角斑病
炭疽病</td></tr>
<tr><td>さやいんげん</td><td>灰色かび病
菌核病
角斑病</td><td rowspan="6">100～
300L/10a</td><td rowspan="2">収穫前日
まで</td></tr>
<tr><td>さやえんどう
実えんどう</td><td>灰色かび病
菌核病
褐紋病</td></tr>
<tr><td>未成熟そらまめ</td><td>さび病</td><td>収穫 3 日
前まで</td></tr>
<tr><td rowspan="3">きゅうり</td><td>うどんこ病
べと病</td><td>1500～
2000 倍</td><td rowspan="3">収穫前日
まで</td><td rowspan="3">4 回以内</td><td rowspan="3">4 回以内</td></tr>
<tr><td>灰色かび病
菌核病</td><td>1500 倍</td></tr>
<tr><td>褐斑病
炭疽病</td><td rowspan="2">2000 倍</td></tr>
<tr><td>にがうり</td><td>うどんこ病
べと病
炭疽病</td><td rowspan="2">収穫 7 日
前まで</td><td>3 回以内</td><td>3 回以内</td></tr>
<tr><td>うり類（漬物
用）</td><td>うどんこ病
つる枯病
べと病
炭疽病</td><td>1500～
2000 倍</td><td>4 回以内</td><td>4 回以内</td></tr>
</table>

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	アゾキシスト ロビンを含む 農薬の総使用 回数
メロン	うどんこ病 つる枯病 べと病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	4 回 以内	散布	4 回以内
すいか	つる枯病 炭疽病						
ズッキーニ	うどんこ病						
トマト	葉かび病 灰色かび病						
なす	うどんこ病 すすかび病 褐色斑点病						
ピーマン	灰色かび病						4 回以内(粒剤は 3 回以内)
葉たまねぎ	灰色腐敗病 べと病			収穫 3 日前まで	3 回 以内		3 回以内
たまねぎ	灰色腐敗病 べと病 灰色かび病			収穫前日まで	4 回 以内		4 回以内
ねぎ	べと病 黄斑病 黒斑病 リゾクトニア葉 鞘腐敗病			収穫 3 日前まで			5 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 4 回以内）
	さび病 葉枯病	16 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
わけぎ	さび病 べと病 黄斑病 黒斑病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前まで		散布	4 回以内
あさつき				収穫 3 日前まで			
にら	白斑葉枯病			収穫 14 日前まで	2 回 以内		2 回以内
にら(花茎)				収穫前日まで			
にんにく	さび病	20 倍	1.6L/10a	収穫 7 日前まで	3 回 以内	無人航空機による散布	3 回以内
	葉枯病	2000 倍	100～ 300L/10a			散布	
らっきょう	さび病			収穫 3 日前まで			

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
レタス	菌核病 すそ枯病 灰色かび病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内（土壌灌注は 2 回以内）
	べと病	16 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
	ビッグベイン病	2000 倍	1.5～3L/㎡	収穫 30 日前まで	2 回以内	土壌灌注	
非結球レタス	菌核病 灰色かび病 べと病		100～ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内
はくさい	べと病	16 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
	黒斑病 白さび病	2000 倍	100～ 300L/10a			散布	
	白斑病	2000～3000 倍					
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病	2000 倍					
ブロッコリー	べと病 黒すす病 菌核病			収穫前日まで	3 回以内		4 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 3 回以内）
非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイ、タアサイ、みずなを除く）	白さび病			収穫 7 日前 まで	2 回以内		2 回以内
チンゲンサイ タアサイ みずな							3 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 2 回以内）
かぶ							
	白斑病						
こまつな	白さび病 白斑病						
畑わさび	白さび病						2 回以内
わさび				畑育苗期			
だいこん				収穫 14 日 前まで	3 回以内		4 回以内(粒剤は 1 回以内、水和剤は 3 回以内)
	ワッカ症						
バジル	べと病			収穫前日まで	2 回以内		2 回以内

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
いちご	うどんこ病	1500～2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	苗床：4 回以内 本圃：3 回以内	散布	8 回以内（苗床では 4 回以内、本圃での土壌混和は 1 回以内、本圃での散布は 3 回以内）
	炭疽病	2000 倍					
	灰色かび病	1500 倍					
	うどんこ病	1500～2000 倍		親株 育成期	3 回以内		
	炭疽病	2000 倍					
	灰色かび病	1500 倍					
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000 倍		収穫前日まで	4 回以内		4 回以内（粒剤は 3 回以内）
てんさい	葉腐病 褐斑病	1500 倍		収穫 14 日前まで	3 回以内		4 回以内（灌注は 1 回以内、散布は 3 回以内）
	根腐病	1500～4000 倍					
		500 倍	ペーパーポット 1 冊当り 1L（3L/㎡）	定植前	1 回	苗床灌注	
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症（輪斑病菌による） もち病	2000 倍	100～400L/10a	摘採 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
みしまさいこ	炭疽病		100～300L/10a	収穫 21 日前まで	4 回以内		4 回以内
エンダイブ	菌核病 すそ枯病				1 回		1 回
パセリ	うどんこ病			収穫 45 日前まで			4 回以内(粒剤は 3 回以内、水和剤は 1 回以内)
みつば	灰色かび病			収穫 14 日前まで　但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで			1 回

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用
病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の
使用
回数</th><th>使用方法</th><th>アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td>みょうが
（花穂）</td><td rowspan="2">紋枯病</td><td rowspan="9">2000 倍</td><td rowspan="2">3L/㎡</td><td>収穫 3 日前まで</td><td rowspan="4">2 回以内</td><td rowspan="2">土壌灌注</td><td rowspan="2">4 回以内
(粒剤は 2 回以内、水和剤は 2 回以内)</td></tr>
<tr><td>みょうが
（茎葉）</td><td>みょうが（花穂）の収穫 3 日前まで　但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで</td></tr>
<tr><td>しそ</td><td>斑点病
さび病</td><td rowspan="9">100～
300L/10a</td><td>収穫前日まで</td><td rowspan="9">散布</td><td>2 回以内</td></tr>
<tr><td>せり</td><td>葉枯病</td><td>収穫 7 日前まで</td><td>4 回以内</td><td>5 回以内
(粒剤は 1 回以内、水和剤は 4 回以内)</td></tr>
<tr><td>クレソン</td><td>斑点病</td><td rowspan="2">収穫 21 日前まで</td><td>3 回以内</td><td>3 回以内</td></tr>
<tr><td>葉ごぼう</td><td rowspan="2">うどんこ病</td><td>1 回</td><td>1 回</td></tr>
<tr><td>オクラ</td><td>収穫前日まで</td><td>2 回以内</td><td>6 回以内
(全面土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内、株元散布は 3 回以内)</td></tr>
<tr><td>こおにたびらこ
ははこぐさ</td><td>菌核病</td><td>収穫 30 日前まで</td><td>1 回</td><td>1 回</td></tr>
<tr><td>セルリー</td><td>斑点病</td><td>収穫 3 日前まで</td><td rowspan="2">4 回以内</td><td rowspan="2">4 回以内</td></tr>
<tr><td>モロヘイヤ</td><td>灰色かび病
黒星病</td><td>収穫前日まで</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ばれいしょ</td><td>疫病
夏疫病</td><td>3000～
4000 倍</td><td>収穫 7 日前まで</td><td>3 回以内</td><td rowspan="4">5 回以内
(種いもへの処理は 1 回以内、植付時の土壌散布は 1 回以内、散布は 3 回以内)</td></tr>
<tr><td>銀か病</td><td rowspan="2">100 倍</td><td>20L/10a</td><td rowspan="3">植付時</td><td rowspan="3">1 回</td><td rowspan="2">植溝内土壌散布</td></tr>
<tr><td rowspan="2">黒あざ病</td><td>10～20L/10a</td></tr>
<tr><td>100～200 倍</td><td>20L/10a</td><td rowspan="2">種いも瞬間浸漬</td></tr>
<tr><td></td><td>500 倍</td><td>－</td><td>植付前</td></tr>
</table>

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：アミスター20 フロアブル

種類：アゾキシストロビン水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
やまのいも	炭疽病	2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	4 回以内（粒剤は 1 回以内、水和剤は 3 回以内）
	葉渋病	32 倍	3.2L/10a			無人航空機による散布	
さといも	疫病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで		散布	3 回以内
		18 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
かんしょ	基腐病	2000 倍	100～300L/10a			散布	
		12～32 倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
せんぶり	さび病	2000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで		散布	
しゅんぎく	炭疽病			収穫前日まで	2 回以内		2 回以内
きく	白さび病			発病初期	5 回以内		5 回以内
食用ぎく				収穫前日まで	2 回以内		2 回以内
トルコギキョウ	斑点病			発病前~発病初期	5 回以内		5 回以内
たばこ	赤星病	2000～3000 倍	100～180L/10a	収穫 10 日前まで	2 回以内		2 回以内(粒剤は 1 回以内、水和剤は 2 回以内)
	菌核病	2000 倍					
とうき	斑点病		100～300L/10a	収穫 30 日前まで	3 回以内		3 回以内
とうき（葉）				収穫 3 日前まで			
食用ミニバラ	うどんこ病			収穫前日まで	2 回以内		2 回以内
つるむらさき	紫斑病						

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号