

殺菌剤

名称：レーバスフロアブル

種類：マンジプロパミド水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024 年 4 月 10 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンジプロパミドを含む農薬の総使用回数							
ぶどう	べと病	2000～3000 倍	200～700L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内							
ばれいしょ	疫病	12 倍	1.6L/10a		2 回以内	無人航空機による散布	2 回以内							
		24 倍	3.2L/10a											
		375～500 倍	25L/10a			散布								
だいず	べと病	1500～3000 倍	60～300L/10a		3 回以内	無人航空機による散布	3 回以内							
	12 倍	0.8L/10a												
あずき	茎疫病	1500～2000 倍	60～300L/10a		2 回以内	散布	3 回以内							
キャベツ	べと病	2000 倍	100～300L/10a					2 回以内	2 回以内					
ブロッコリー								3 回以内	3 回以内					
はくさい								収穫 3 日前まで	2 回以内	2 回以内				
ほうれんそう				収穫 7 日前まで					3 回以内	3 回以内				
レタス 非結球レタス									2 回以内	2 回以内				
たまねぎ				白色疫病 べと病				1500～2000 倍	200～700L/10a	収穫前日まで	2 回以内	2 回以内		
すいか				褐色腐敗病							2000 倍	200～700L/10a	3 回以内	3 回以内
なす														
トマト				疫病				2000 倍	100～300L/10a	親株育成期				
ミニトマト					3 回以内	2 回以内								
ピーマン														
かんきつ	褐色腐敗病	2000 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3 回以内	3 回以内								
いちじく	疫病				100～300L/10a		育苗期	2 回以内						
								生育期、但し収穫前日まで	本圃：2 回以内					

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺菌剤

名称：レーバスフロアブル

種類：マンジプロパミド水和剤

作物名	適用 病害虫 名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	マンジプロパ ミドを含む農 薬の総使用回 数
せんきゅ う	べと病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫 30 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
たばこ	疫病	1000 倍	100～ 180L/10a	収穫 10 日 前まで	2 回以内		2 回以内
ホップ	べと病	2000 倍	200～ 700L/10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内		3 回以内
バジル			100～ 300L/10a	収穫 3 日前 まで	2 回以内		2 回以内
えだまめ	べと病	12 倍	0.8L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	無人航空機 による散布	3 回以内
		1500～3000 倍	100～ 300L/10a			散布	
	茎疫病	1500～2000 倍					