

殺虫殺菌剤

名称:クルーザーMAXX  
種類:チアマトキサム・フルジオキシニル・メタラキシルM水和剤

適用の範囲と使用方法

2019年2月13日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	チアマトキサ ムを含む農薬 の総使用回数	フルジオキシ ニルを含む農 薬の総使用回 数	メタラキシル 及びメタラキ シルMを含む 農薬の総使用 回数
あずき	アブラムシ類 タネバエ 茎疫病	原液	乾燥種子 1kg当り 8mL	は種前	1回	塗沫処理	3回以内(は種 前の塗沫処理 は1回以内、 は種後は2回 以内)	1回	4回以内 (種子粉衣及 びは種前の塗 沫処理は合計 1回以内、は 種後は3回以 内)
だいず	アブラムシ類 タネバエ ネキリムシ類 フタスジヒメハムシ 茎疫病							1回	
えだまめ	リゾクトニア根腐病 苗立枯病 (ピシウム菌) 紫斑病 黒根腐病 白絹病							4回以内 (は種前の塗 沫処理は1回 以内、は種後 は3回以内)	
いんげんま め	苗立枯病 (ピシウム菌) リゾクトニア根腐病 アブラムシ類 タネバエ							4回以内 (種子への処 理は1回以 内、散布は3 回以内)	1回

### 殺虫殺菌剤

名称:クルーザーMAXX  
種類:チアトキサム・フルジオキソニル・メタラキシルM水和剤

適用の範囲と使用方法

2019年2月13日現在

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアトキサムを含む農薬の総使用回数	フルジオキソニルを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
だいず	ハト、キジバトによる種子食害忌避	原液	乾燥種子 1kg当り 8mL	は種前	1回	塗沫処理	3回以内 (は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は2回以内)	1回	4回以内 (種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内)
えだまめ								4回以内 (は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は3回以内)	1回