

殺虫剤

名称：ジュリボフロアブル
種類：クロラントラニリプロール・チアメトキサム水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 10 月 12 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロラントラ ニリプロール を含む農薬の 総使用回数	チアメトキサ ムを含む農薬 の総使用回数
キャベツ	アブラムシ類 アオムシ ハイマダラノメイガ ネギアザミウマ ハスモンヨトウ コナガ ネキリムシ類 ヨトウムシ	1000 倍	苗地床 1 m ² 当 り 2L	は種時～ 育苗期後 半	1 回	灌注	4 回以内（定植 時までの処理 は 1 回以内、 定植後の処理 は 3 回以内）	4 回以内（定植 時までの処理 は 1 回以内、 定植後の散布 は 3 回以内）
	アブラムシ類 ネギアザミウマ コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	200 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱ま たはペーパー ポット 1 冊 （約 30×60cm、使 用土壌約 1.5～ 4L）当り 0.5L	育苗期後 半～定植 当日				
	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ オオタバコガ	4000 倍	100～300L/10a	収穫 3 日 前まで	3 回以内	散布		

殺虫剤

名称：ジュリボフロアブル
種類：クロラントラニリプロール・チアメトキサム水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 10 月 12 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロラントラ ニリプロール を含む農薬の 総使用回数	チアメトキサ ムを含む農薬 の総使用回数
はくさい	アブラムシ類 コナガ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ キスジノミハムシ カブラハバチ	200 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱ま たはペーパー ポット 1 冊 (約 30×60cm、使 用土壌約 1.5～ 4L) 当り 0.5L	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植 時までの処理 は 1 回以内、 定植後の処理 は 3 回以内)	4 回以内 (定 植時までの処 理は 1 回以 内、定植後の 散布は 3 回以 内)
	コナガ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ アブラムシ類 ハスモンヨトウ	4000 倍	100～300L/10a	収穫 3 日 前まで	3 回以内	散布		
ブロッコ リー	アブラムシ類 ネギアザミウマ コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	200 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱ま たはペーパー ポット 1 冊 (約 30×60cm、使 用土壌約 1.5～ 4L) 当り 0.5L	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植 時までの処理 は 1 回以内、 定植後の処理 は 3 回以内)	
	アブラムシ類 ハスモンヨトウ コナガ アオムシ	4000 倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布		

殺虫剤

名称：ジュリボフロアブル
種類：クロラントラニリプロール・チアメトキサム水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 10 月 12 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロラントラ ニリプロール を含む農薬の 総使用回数	チアメトキサ ムを含む農薬 の総使用回数
レタス	アブラムシ類 カブラヤガ ヒメフタテンヨコバ イ ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ	200 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱ま たはペーパー ポット 1 冊 (約 30×60cm、使 用土壌約 1.5～ 4L) 当り 0.5L	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植 時までの処理 は 1 回以内、 定植後の処理 は 3 回以内)	3 回以内 (種 子への処理、 水和剤の灌注 及び粒剤の処 理は合計 1 回 以内、定植後 の散布は 2 回 以内)
	アブラムシ類 ナモグリバエ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ	4000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布		
非結球 レタス	アブラムシ類 カブラヤガ ヒメフタテンヨコバ イ ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ	200 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱ま たはペーパー ポット 1 冊 (約 30×60cm、使 用土壌約 1.5～ 4L) 当り 0.5L	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植 時までの処理 は 1 回以内、 定植後の処理 は 3 回以内)	1 回

殺虫剤

名称：ジュリボフロアブル
種類：クロラントラニリプロール・チアメトキサム水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 10 月 12 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロラントラ ニリプロール を含む農薬の 総使用回数	チアメトキサ ムを含む農薬 の総使用回数
ねぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ タマネギバエ タネバエ ネキリムシ類 ネダニ類	200 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱ま たはペーパー ポット 1 冊 (約 30×60cm、使 用土壌約 1.5～ 4L) 当り 0.5L	育苗期後 半～定植 当日	1 回	灌注	4 回以内 (灌注 は 1 回以内、 定植後の処理 は 3 回以内)	4 回以内 (定 植時までの処 理は 1 回以 内、定植後の 処理は 3 回以 内)
	4 回以内 (灌注 は 1 回以内、 散布は 3 回以 内)						1 回	
	2 回以内 (灌注 は 1 回以内、 散布は 1 回以 内)							
なばな類	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ							
パセリ	ハスモンヨトウ							