

殺菌剤
名称：スコア顆粒水和剤
 種類：ジフェノコナゾール水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024 年 7 月 24 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフェノコナゾールを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 うどんこ病 黒点病	3000 倍	200～ 700L/10a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
	モニリア病 褐斑病	2000～3000 倍					
	黒星病 赤星病	3000～4000 倍					
なし	黒星病 赤星病	2000～4000 倍	8L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	無人航空 機による 散布	2 回以内
	輪紋病 黒斑病	2000 倍					
かき	うどんこ病 炭疽病	3000 倍	8L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	無人航空 機による 散布	2 回以内
	落葉病	40 倍					
おうとう	灰星病	2000 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内
もも	灰星病						
ネクタリン	黒星病	2000～3000 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内
すもも	灰星病						
あんず	灰星病	2000 倍	4L/10a	収穫前日 まで	2 回以内	無人航空 機による 散布	2 回以内
うめ	黒星病 すす斑病	2000～3000 倍					
	20 倍	4L/10a	200～ 700L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
マルメロ	ごま色斑点 病						
メロン	つる枯病 うどんこ病	2000 倍	200～ 400L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
すいか	つる枯病 うどんこ病 炭疽病						
トマト	葉かび病 すすかび病	2000 倍	200～ 400L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
ピーマン	うどんこ病 黒枯病 斑点病						
なす	すすかび病 うどんこ病 黒枯病	2000 倍	200～ 400L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺菌剤

名称：スコア顆粒水和剤

種類：ジフェノコナゾール水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジフェノ コナゾー ルを含む 農薬の総 使用回数
きゅうり	うどんこ病 黒星病	2000 倍	200～ 400L/10a	収穫前日ま で	3 回以内	散布	3 回以内
かぼちゃ	うどんこ病			収穫 3 日前 まで			
		12 倍	1.6L/10a			無人航空 機による 散布	
セルリー	斑点病	2000 倍	200～ 400L/10a	収穫前日ま で	2 回以内	散布	2 回以内
いちご	うどんこ病			収穫 3 日前 まで			
パセリ							
しょうが	白星病	2000 倍	100～ 400L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
		36 倍	3.2L/10a			無人航空 機による 散布	
びわ	灰斑病	4000 倍	200～ 700L/10a	収穫 21 日 前まで			
茶	炭疽病 もち病 網もち病 褐色円星病	2000 倍	200～ 400L/10a	摘採 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
アスパラ ガス	斑点病		200～ 500L/10a	収穫前日ま で			
トルコギキ ョウ	斑点病	2000 倍	100～ 300L/10a	発病前～発 病初期	6 回以内	散布	6 回以内