殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル 20

種類：フルジオキソニル水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法 2026 年 8 月 5 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキソニルを含む農薬の総使用回数
いんげんまめ	-	灰色かび病 菌核病	1000～1500 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内（種子への処理は 1 回以内、散布は 3 回以内）
さやいんげん			1000 倍		収穫前日まで			3 回以内
さやえんどう								
豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く）		灰色かび病						
えだまめ		赤かび病						4 回以内（は種前の塗沫処理は 1 回以内、は種後は 3 回以内）
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	灰色かび病 菌核病 褐斑病	33 倍	10L/10a			常温煙霧	3 回以内
	-	灰色かび病 菌核病	1000～1500 倍	100～300L/10a			散布	
		褐斑病	1000 倍					
すいか		菌核病 炭疽病						
メロン		菌核病						
トマト		灰色かび病	1000～1500 倍					4 回以内（種子への処理は 1 回以内、散布は 3 回以内）
		斑点病 立枯病	1000 倍					
ミニトマト		灰色かび病	1000～1500 倍					3 回以内
		斑点病 立枯病	1000 倍					
なす	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	灰色かび病 フザリウム立枯病 褐色斑点病	33 倍	10L/10a			常温煙霧	
	-	フザリウム立枯病	1000 倍	100～300L/10a			散布	
		灰色かび病	1000～1500 倍					
		褐色斑点病	1500 倍					

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社 東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル 20

種類：フルジオキソニル水和剤

作物名	適用場所	適用 病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	フルジオキソニルを含む農薬の総使用回数
ピーマン	-	灰色かび病 炭疽病	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前 日まで	3 回 以内	散布	3 回以内
いちご		灰色かび病	1000～ 1500 倍					
		炭疽病 黒腐病	1000 倍					
たまねぎ		灰色かび病	1000～ 1500 倍					4 回以内（定植前は 1 回以内、定植後は 3 回以内）
		小菌核病	1500 倍					
		灰色腐敗病	500 倍	-	定植直 前	1 回	5 分 間セ ル苗 浸漬	
			500～ 1000 倍				5 分 間苗 根部 浸漬	
		黒腐菌核病						
ねぎ		小菌核腐敗病 黒腐菌核病 白絹病	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前 日まで	3 回 以内	散布	3 回以内
らっきょう		灰色かび病	1000～ 1500 倍					
キャベツ		菌核病 株腐病	1000 倍					4 回以内（種子への処理は 1 回以内、散布は 3 回以内）
はくさい		菌核病 炭疽病						3 回以内
結球あぶらな科葉菜類（はくさい、キャベツを除く）		菌核病			収穫前日まで但し、メキャベツにあっては本葉切り落とし開始の前日まで			
にら		白斑葉枯病	2000 倍		収穫 7 日前まで	1 回		1 回
にんにく						3 回 以内		3 回以内
ふき		灰色かび病	1000 倍			2 回 以内		2 回以内

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル 20

種類：フルジオキソニル水和剤

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキソニルを含む農薬の総使用回数
にんじん	-	菌核病	1000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
しそ			1500 倍			2 回以内		2 回以内
ブロッコリー			1000 倍		収穫 3 日前まで	3 回以内		3 回以内
わけぎ		小菌核腐敗病	1000 倍					
オリーブ		炭疽病		200～700L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内
オリーブ(葉)					収穫 60 日前まで			
びわ		灰斑病	1000 倍	200～700L/10a	収穫 21 日前まで	3 回以内		3 回以内
おうとう		黒斑病 炭疽病 褐色せん孔病			収穫前日まで			
		灰星病	1000～2000 倍					
ばれいしょ		そうか病	200 倍	-	植付前	1 回	種いも瞬間浸漬	1 回
ぶどう		晩腐病 灰色かび病 黒とう病	1000～2000 倍	200～700L/10a	収穫 21 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
		白腐病 綿房病	1000 倍					
マンゴー		炭疽病			収穫前日まで			
食用ぎく		灰色かび病		100～300L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内		2 回以内
食用金魚草			1500 倍					
せんりょう		炭疽病	1000 倍	200～700L/10a	発病前～発病初期	4 回以内		4 回以内
花き類・観葉植物（きんせんか、ホワイトレースフラワーを除く）		灰色かび病	1000 倍	100～300L/10a				
きんせんか		灰色かび病 炭疽病	1000 倍	100～300L/10a	発病前～発病初期	4 回以内	散布	4 回以内
ホワイトレースフラワー		灰色かび病 黄斑病						

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト（https://www.syngenta.co.jp/cp）を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社　東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号