

殺菌剤

名称: セイビアーフロアブル20
種類: フルジオキシニル水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年7月21日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病	1000~1500倍	100~300L /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)
さやいんげん							
さやえんどう							
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)	灰色かび病	1000倍		4回以内 (は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は3回以内)			
えだまめ	赤かび病						
きゅうり	灰色かび病 菌核病	1000~1500倍		収穫前日 まで			3回以内
	褐斑病	1000倍					
すいか	菌核病 炭疽病			1000倍			
トマト	灰色かび病	1000~1500倍		4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布は3回以内)			
ミニトマト							
なす			フザリウム立枯病		1000倍		
	褐色斑点病	1500倍					
ピーマン	灰色かび病 炭疽病	1000倍					
らっきょう	灰色かび病	1000~1500倍	3回以内				

殺菌剤

名称: セイビアーフロアブル20
種類: フルジオキシニル水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年7月21日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数	
いちご	灰色かび病	1000~1500倍	100~300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	炭疽病	1000倍						
	黒腐病							
ねぎ	小菌核腐敗病	1000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	黒腐菌核病							
	白絹病							
たまねぎ	灰色かび病	1000~1500倍	-	定植直前	1回	5分間 セル苗浸漬	4回以内 (定植前は1回以内、定植後は3回以内)	
	小菌核病	1500倍						
	灰色腐敗病	500倍						
	黒腐菌核病	500~1000倍						
ばれいしょ	そうか病	200倍		植付前		種いも瞬間浸漬	1回	
キャベツ	菌核病 株腐病	1000倍	100~300L /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布は3回以内)	
にんにく	白斑葉枯病	2000倍		収穫7日前まで				1回
にら					1回			
ふき	灰色かび病	1000倍	200~700L /10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内	
オリーブ	炭疽病			1000倍				200~700L /10a
オリーブ(葉)								
わけぎ	小菌核腐敗病	100~300L /10a	100~300L /10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内	
しそ	菌核病			1500倍				収穫7日前まで

殺菌剤

名称: セイビアーフロアブル20
種類: フルジオキシニル水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年7月21日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数	
にんじん	菌核病	1000倍	100~300L /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
ブロッコリー				収穫3日前まで				
メロン				収穫前日まで				
マンゴー	炭疽病	1000~2000倍	200~700L /10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	
ぶどう	白腐病							
	晩腐病 灰色かび病							
おうとう	灰星病	1000~2000倍	200~700L /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
びわ	灰斑病	1000倍		収穫45日前まで				
食用ぎく	灰色かび病	1500倍	100~300L /10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内	
食用金魚草		1000倍		200~700L /10a	発病前 ~発病初期			4回以内
花き類・観葉植物 (きんせんか、ホワイトレースフラワーを除く)								
せんりょう	炭疽病	1000倍	100~300L /10a	発病前 ~発病初期	4回以内	散布	4回以内	
きんせんか	灰色かび病 炭疽病							
	ホワイトレース フラワー							灰色かび病 黄斑病