

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル20

種類：フルジオキシニル水和剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023年4月26日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
いんげんまめ	-	灰色かび病 菌核病	1000～ 1500倍	100～ 300L/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	4回以内（種子への処理は 1回以内、散布は3回以 内）
さやいんげん								
さやえんどう								
豆類（未成熟、 ただし、えだま め、さやいんげ ん、さやえんど うを除く）		灰色かび病	1000倍		収穫前日 まで			3回以内
えだまめ		赤かび病						

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル20

種類：フルジオキシニル水和剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023年4月26日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農業の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	灰色かび病	33倍	10L/10a	収穫前日まで	3回以内	常温煙霧	3回以内
		菌核病						
		褐斑病						
すいか	-	灰色かび病	1000~	100~ 300L/10a				
		菌核病	1500倍					
		褐斑病	1000倍					
メロン	-	菌核病		1000倍				
		炭疽病						
トマト	-	灰色かび病	1000~ 1500倍	4回以内（種子への処理は1回以内、散布は3回以内）				
ミニトマト	-	灰色かび病	1000~ 1500倍		散布			
なす	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	灰色かび病	33倍	10L/10a		収穫前日まで	3回以内	常温煙霧
		フザリウム立枯病						
		褐色斑点病						
	-	フザリウム立枯病	1000倍	100~ 300L/10a				
		灰色かび病	1000~ 1500倍					
褐色斑点病		1500倍						

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル20

種類：フルジオキシニル水和剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023年4月26日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農業の総使用回数
ピーマン	-	灰色かび病 炭疽病	1000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
いちご		灰色かび病	1000~ 1500倍					
		炭疽病 黒腐病	1000倍					
たまねぎ		灰色かび病	1000~ 1500倍					
		小菌核病	1500倍					
		灰色腐敗病	500倍					
		黒腐菌核病	500~ 1000倍	5分間苗根部浸漬				
ねぎ		小菌核腐敗病 黒腐菌核病 白絹病	1000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
らっきょう		灰色かび病	1000~ 1500倍					

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル20

種類：フルジオキシニル水和剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023年4月26日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
キャベツ	-	菌核病 株腐病	1000倍	100~ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内（種子への処理は1回以内、散布は3回以内）
結球あぶらな科葉菜類 (キャベツを除く)		菌核病	1000倍		収穫前日まで 但し、メキャベツにあつては本葉切り落とし開始の前日まで	3回以内		3回以内
にら		白斑葉枯病	2000倍		収穫7日前まで	1回		1回
にんにく						3回以内		3回以内
ふき		灰色かび病	1000倍			2回以内		2回以内

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル 20

種類：フルジオキシニル水和剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023 年 4 月 26 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
にんじん	-	菌核病	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内
しそ			1500 倍			2 回以内		2 回以内
ブロッコリー			1000 倍		収穫 3 日 前まで	3 回以内		3 回以内
わけぎ		小菌核腐敗病	3 回以内					
オリーブ		炭疽病	1000 倍	200～ 700L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内		2 回以内
オリーブ(葉)					収穫 60 日前まで			
びわ		灰斑病	1000 倍	200～ 700L/10a	収穫 21 日前まで	3 回以内		3 回以内
おうとう		灰星病	1000～ 2000 倍		収穫前日 まで			
ばれいしょ		そうか病	200 倍	-	植付前	1 回		種いも瞬間 浸漬

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル20

種類：フルジオキシニル水和剤

適用害虫の範囲及び使用方法

2023年4月26日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数		
ぶどう	-	晩腐病	1000~2000倍	200~700L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内		
		灰色かび病								
白腐病		1000倍	100~300L/10a		収穫3日前まで				2回以内	2回以内
炭疽病										
マンゴー		炭疽病	1500倍	100~300L/10a	収穫3日前まで	2回以内			2回以内	
食用ぎく		灰色かび病								
食用金魚草		炭疽病	1000倍	200~700L/10a	発病前~発病初期	4回以内			4回以内	
せんりょう		炭疽病								
花き類・観葉植物（きんせんか、ホワイトレースフラワーを除く）		灰色かび病	1000倍	100~300L/10a	100~300L/10a	発病前~発病初期			4回以内	4回以内
きんせんか		灰色かび病 炭疽病	1000倍	100~300L/10a						
ホワイトレースフラワー	灰色かび病 黄斑病									