

殺菌剤

名称：セイビアーフロアブル 20

種類：フルジオキシニル水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2025 年 6 月 25 日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数		
いんげんまめ	-	灰色かび病 菌核病	1000～1500 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内（種子への処理は 1 回以内、散布は 3 回以内）		
さやいんげん			1000 倍		3 回以内					
さやえんどう		1000 倍						3 回以内		
豆類（未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く）			赤かび病		4 回以内（は種前の塗沫処理は 1 回以内、は種後は 3 回以内）					
えだまめ	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	灰色かび病		33 倍		10L/10a	3 回以内	常温煙霧	3 回以内	
きゅうり		菌核病								
		褐斑病								
		灰色かび病 菌核病	1000～1500 倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布				4 回以内（種子への処理は 1 回以内、散布は 3 回以内）
すいか		褐斑病								
		菌核病 炭疽病	1000 倍							
メロン		菌核病	1000～1500 倍							
トマト	灰色かび病									
	斑点病									
ミニトマト	灰色かび病	1000～1500 倍	1000 倍				100～300L/10a	3 回以内	常温煙霧	
	斑点病									
	フザリウム立枯病	1000 倍								
なす	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	灰色かび病	33 倍	10L/10a	3 回以内	常温煙霧	3 回以内			
		フザリウム立枯病								
		褐色斑点病								
-	-	フザリウム立枯病	1000 倍	100～300L/10a	3 回以内	散布	3 回以内			
		灰色かび病	1000～1500 倍							
		褐色斑点病	1500 倍							

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

## 殺菌剤

## 名称：セイビアーフロアブル 20

種類：フルジオキシニル水和剤

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数
ピーマン	-	灰色かび病 炭疽病	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
いちご		灰色かび病	1000～ 1500 倍					
		炭疽病 黒腐病	1000 倍					
たまねぎ		灰色かび病	1000～ 1500 倍					
		小菌核病	1500 倍					
		灰色腐敗病	500 倍					
			500～ 1000 倍					
		黒腐菌核病	500～ 1000 倍					
ねぎ		小菌核腐敗病 黒腐菌核病 白絹病	1000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
らっきょう		灰色かび病	1000～ 1500 倍					
キャベツ		菌核病 株腐病	1000 倍		収穫前日 まで	3 回 以内	散布	4 回以内（種子 への処理は 1 回以内、散布 は 3 回以内）
結球あぶら な科葉菜類 （キャベツ を除く）		菌核病	1000 倍		収穫前日 まで 但し、メ キャベツ にあつて は本葉切 り落とし 開始の前 日まで			
にら		白斑葉枯病	2000 倍		1 回	1 回		
にんにく	3 回 以内				3 回以内			
ふき	2 回 以内				2 回以内			

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

## 殺菌剤

## 名称：セイビアーフロアブル 20

種類：フルジオキシニル水和剤

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数	
にんじん	-	菌核病	1000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
しそ			1500 倍			2 回以内		2 回以内	
ブロッコリー			1000 倍		3 回以内	3 回以内			
わけぎ		小菌核腐敗病	1000 倍	200～700L/10a	収穫 3 日前まで	3 回以内		2 回以内	2 回以内
オリーブ		炭疽病			収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内	2 回以内
オリーブ(葉)			収穫 60 日前まで						
びわ		灰斑病	1000 倍	200～700L/10a	収穫 21 日前まで	3 回以内		3 回以内	
おうとう		黒斑病 炭疽病 褐色せん孔病			1000～2000 倍				収穫前日まで
		灰星病							
ばれいしょ		そうか病	200 倍	-	植付前	1 回		種いも瞬間浸漬	1 回
ぶどう		晩腐病 灰色かび病 黒とう病	1000～2000 倍	200～700L/10a	収穫 21 日前まで	3 回以内		3 回以内	
		白腐病	1000 倍						収穫前日まで
マンゴー		炭疽病		1000 倍	100～300L/10a	収穫 3 日前まで		2 回以内	2 回以内
食用ぎく		灰色かび病	1500 倍			300L/10a		2 回以内	2 回以内
食用金魚草									
せんりょう	炭疽病	1000 倍	200～700L/10a	発病前～発病初期	4 回以内	散布	4 回以内		
花き類・観葉植物(きんせんか、ホワイトレースフラワーを除く)	灰色かび病	1000 倍	100～300L/10a						
きんせんか	灰色かび病 炭疽病	1000 倍	100～300L/10a	発病前～発病初期	4 回以内	散布	4 回以内		
ホワイトレースフラワー	灰色かび病 黄斑病								

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。