

殺虫剤

名称: チェス顆粒水和剤
種類: ピメロジン水和剤

適用の範囲と使用方法

2020年9月9日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピメロジンを含む農薬の総使用回数				
もも	アブラムシ類	5000倍	200~700L /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内				
なし				収穫21日前まで							
うめ											
うり類 (漬物用)			収穫前日まで	3回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する			3回以内			
にがうり			収穫開始3日前まで								
みょうが (花穂)			収穫前日まで								
ズッキーニ			アブラムシ類	5000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時の株元散布は1回以内、散布は2回以内)		
ピーマン						3回以内	4回以内 (育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)				
とうがらし類											
メロン						4回以内	4回以内		5回以内 (育苗期の株元散布は1回以内、散布は4回以内)		
すいか											
ばれいしょ										1000倍	25L/10a
オクラ						6000倍	100~300L /10a		収穫前日まで		

殺虫剤

名称: : チェス顆粒水和剤
種類: ピメロジン水和剤

適用の範囲と使用方法

2020年9月9日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピメロジンを含む農薬の総使用回数
トマト ミニトマト きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類	5000倍	100～300L /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
なす							4回以内 (育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)
いちご							3回以内
花き類・ 観葉植物				発生初期	4回以内		4回以内