

殺菌剤
名称：チルト乳剤 25
 種類：プロピコナゾール乳剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024 年 4 月 10 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロピコナゾールを含む農薬の総使用回数	
小麦	赤さび病	1000～3000 倍	60～150L/10a	収穫 3 日前まで	3 回以内	散布	5 回以内 (根雪前は 2 回以内、 春期以降は 3 回以内)	
		250～500 倍	25L/10a					
	うどんこ病	2000～3000 倍	60～150L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	無人航空機による散布		
	赤かび病	8 倍	0.8L/10a	収穫 3 日前まで		散布		
		1000～2000 倍	60～150L/10a					
	眼紋病 黒変病	1000 倍	根雪前	2 回以内	散布			
	黄斑病 葉枯症	8 倍				0.8L/10a		無人航空機による散布
	なまぐさ黒穂病	750 倍				60～150L/10a		散布
		750～1000 倍				0.8L/10a		
	紅色雪腐病	8 倍	25L/10a	無人航空機による散布				
雪腐小粒菌核病	150 倍	0.8L/10a						
大麦	雲形病 網斑病	1000 倍	60～150L/10a	収穫 21 日前まで	1 回	散布	1 回	
	うどんこ病	2000～3000 倍						
	赤かび病	1000～2000 倍						0.8L/10a
8 倍								
とうもろこし	すす紋病	1000 倍	100～300L/10a	収穫 7 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
		8 倍	0.8L/10a					無人航空機による散布
16 倍		1.6L/10a	散布					
飼料用 とうもろこし		1000 倍				100～300L/10a		無人航空機による散布
		8 倍	0.8L/10a					
16 倍		1.6L/10a						
きく	白さび病	3000 倍	100～300L/10a	発病初期	3 回以内	散布	3 回以内	

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。