

除草剤

名称:デュアルゴールド
種類:S-メトラクロール乳剤

適用の範囲と使用方法

2019年7月10日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
とうもろこし 飼料用 とうもろこし	一年生イネ科雑草	本葉1~2葉期 (イネ科雑草 2葉期まで)	70~ 100mL/10a				
	かんしょ	一年生雑草					
挿苗後 但し、収穫90日前 まで (雑草発生前)							
マルチ前 ・挿苗前 (雑草発生前)							
えだまめ (移植栽培)	一年生雑草	定植前 (雑草発生前)	70~ 130mL/10a	70~100L /10a	全面土壌 散布	1回	
えだまめ (直播栽培)		は種後出芽前 (雑草発生前)					
だいず							
らっかせい いんげんまめ さやいんげん							
てんさい (直播栽培)	一年生イネ科雑草		は種後出芽前期 (雑草発生前)	70~ 100mL/10a			
	一年生雑草	中耕後 但し、収穫90日前 まで (雑草発生前)	2回以内				
定植後 但し、収穫90日前 まで (雑草発生前)							
中耕後 但し、収穫90日前 まで (雑草発生前)							
てんさい (移植栽培)							

除草剤

名称:デュアルゴールド
種類:S-メトラクロール乳剤

適用の範囲と使用方法

2019年7月10日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
さといも	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生前)	70～ 130mL/10a	70～100L /10a	1回	全面土壌 散布	1回
キャベツ		定植直後 ～定植15日後まで (雑草発生前)	40～ 60mL/10a		1回	畦間株間 土壌散布	
ばれいしょ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	100～ 130mL/10a			全面土壌 散布	
こんにゃく		植付後 又は培土後萌芽 前 (雑草発生前)		1回			
やまのいも		植付後萌芽前 (雑草発生前)	70～ 130mL/10a	全面土壌 散布			
べにばな いんげん		は種後出芽前 (雑草発生前)			100L/10a		
たदैい	一年生イネ科雑草	定植活着後 又は 収穫後 (雑草発生前)	100mL/10a		2回以内		2回以内