

殺虫剤

名称:フォース粒剤  
種類:テフルトリン粒剤

適用の範囲と使用方法

2021年2月10日現在

| 作物名                               | 適用病害虫名              | 使用量       | 使用時期       | 本剤の使用回数 | 使用方法                                     | テフルトリンを含む農薬の総使用回数 |        |        |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------|---------|--|-------------------|--------|--------|
| かんしょ                              | コガネムシ類幼虫<br>ハリガネムシ類 | 9kg/10a   | 植付前        | 1回      | 全面土壌混和又は<br>作条土壌混和                       | 1回                |        |        |
| らっかせい                             | コガネムシ類幼虫            |           | は種時        |         | 播溝土壌混和又は<br>全面土壌混和                       |                   |        |        |
| ほうれんそう                            | ホウレンソウケナガ<br>コナダニ   |           | は種前        |         | 全面土壌混和                                   |                   |        |        |
| レタス<br>非結球レタス                     | ネキリムシ類              | 定植時       |            |         |  |                   |        |        |
| キャベツ<br>はくさい<br>ブロッコリー<br>茎ブロッコリー |                     |           | 4kg/10a    |         |  |                   |        |        |
| 小倉はくさい菜                           |                     |           |            |         | は種前                                      |                   | 全面土壌混和 |        |
| はつかだいこん                           | キスジノミハムシ            | 6~9kg/10a |            | は種時     | 2回以内<br>(は種時までの処理<br>は1回以内、は種後<br>は1回以内) |                   |        |        |
| だいこん                              | タネバエ                | 4kg/10a   |            |         |  |                   |        |        |
|                                   | キスジノミハムシ            | 6kg/10a   | 収穫14日前まで   |         |  | 1回                | 株元散布   |        |
| かぶ                                | キスジノミハムシ            | 4kg/10a   | は種時        | 1回      | 播溝土壌混和                                   | 1回                |        |        |
| 非結球あぶらな<br>科葉菜類                   | ネキリムシ類              |           |            |         |  |                   |        |        |
| なばな類                              | キスジノミハムシ            |           |            |         |  |                   |        |        |
| にんじん                              | クロバネキノコバエ<br>類      | 12kg/10a  | は種前        | 1回      | 全面土壌混和                                   | 1回                |        |        |
|                                   | にんじん(葉)             | ネキリムシ類    | 4~12kg/10a |         |  |                   | は種時    | 作条土壌混和 |
| 4kg/10a                           |                     |           | は種前        |         | 全面土壌混和                                   |                   |        |        |
|                                   |                     |           | 4kg/10a    |         |  |                   |        |        |

# 殺虫剤

名称:フォース粒剤  
種類:テフルトリン粒剤

適用の範囲と使用方法

2021年2月10日現在

| 作物名        | 適用病害虫名             | 使用量       | 使用時期                             | 本剤の使用回数 | 使用方法           | テフルトリンを含む農薬の総使用回数                   |
|------------|--------------------|-----------|----------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------|
| ねぎ         | ネダニ類<br>クロバネキノコバエ類 | 9kg/10a   | 定植時                              | 1回      | 作条土壌混和         | 2回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) |
|            | ネキリムシ類             | 4~9kg/10a |                                  |         |                |                                     |
|            | ネダニ類               | 6~9kg/10a | 土寄せ前<br>但し、収穫30日前まで              | 1回      | 株元散布           |                                     |
|            | クロバネキノコバエ類         | 9kg/10a   |                                  |         |                |                                     |
| パセリ        | ネキリムシ類             | 4kg/10a   | は種時                              | 1回      | 播溝土壌混和         | 1回                                  |
|            |                    |           | 定植時                              |         | 植溝土壌混和又は全面土壌混和 |                                     |
| ごぼう        |                    |           | は種時                              |         | 全面土壌混和         |                                     |
| ザーサイ       | キスジノミハムシ           |           |                                  |         |                |                                     |
| やまのいも(むかご) | タネバエ               |           | 植付時                              |         | 植溝土壌混和         |                                     |
| やまのいも      |                    |           |                                  |         |                |                                     |
| みしまさいこ     | ネキリムシ類             | 6kg/10a   | 萌芽期                              |         | 株元散布           |                                     |
| しょうが       |                    | 6~9kg/10a |                                  |         |                |                                     |
| さとうきび      | ハリガネムシ類            | 6kg/10a   | 植付時                              |         | 植溝土壌混和         |                                     |
| うめ         | アカマダラケシキスイ         | 10kg/10a  | 収穫3日前まで                          |         | 全面土壌混和         |                                     |
| 茶          | ナガチャコガネ            | 9kg/10a   | 成虫飛来初期から<br>ふ化幼虫期 但し、<br>摘採7日前まで |         | 雨落ち部土壌混和       |                                     |
| つつじ類       | コガネムシ類幼虫           |           | 植付時                              |         | 全面土壌混和         |                                     |
| いちご        |                    | 6kg/10a   | 植付時(仮植床)                         |         |                | 2回以内<br>(仮植床は1回以内、<br>本圃は1回以内)      |
|            | ネキリムシ類             |           | 定植時                              | 1回      | 作条土壌混和         |                                     |