

殺菌剤

名称：フォリオゴールド

種類：メタラキシル M・TPN 水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024 年 4 月 24 日現在

| 作物名   | 適用病害虫名       | 希釈倍数           | 使用<br>液量         | 使用<br>時期          | 本剤の<br>使用<br>回数  | 使用<br>方法 | メタラキシル<br>及びメタラキ<br>シル M を含<br>む農薬の総使<br>用回数 | TPN を含む<br>農薬の総使<br>用回数                        |  |
|-------|--------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------|--|--|--|
| ぶどう   | べと病          | 1500 倍         | 200～<br>700L/10a | 収穫 60<br>日前ま<br>で | 2 回以内            | 散布       | 2 回以内  | 3 回以内(休<br>眠期は 1 回<br>以内)                      |  |
| ばれいしょ | 疫病           | 500～<br>1000 倍 | 100～<br>400L/10a | 収穫 7<br>日前ま<br>で  | 3 回以内            |          | 3 回以内  | 5 回以内  |  |
| トマト   | 葉かび病         | 800 倍          |                  | 疫病                | 800～<br>1000 倍   |          | 4 回以内  | 5 回以内<br>(種子への処<br>理は 1 回以<br>内、は種後は<br>4 回以内) | 6 回以内<br>(土壌灌注<br>は 2 回以<br>内、散布、<br>常温煙霧、<br>くん煙及び<br>エアゾル剤の<br>噴射は合計<br>4 回以内)   |
|       | ミニトマト        | 葉かび病           |                  |                   |                  |          |  |  |  |
| なす    | 褐色腐敗病        | 800～<br>1000 倍 |                  | うどんこ病<br>すすかび病    | 800 倍            |          | 3 回以内  | 4 回以内<br>(種子への処<br>理は 1 回以<br>内、は種後は<br>3 回以内) | 4 回以内  |
|       | かぼちゃ         | 疫病<br>べと病      |                  |                   |                  |          |  |  |  |
| きゅうり  | うどんこ病<br>褐斑病 | 800 倍          |                  | べと病               | 800～<br>1000 倍   |          | 3 回以内  | 4 回以内<br>(種子への処<br>理は 1 回以<br>内、は種後は<br>3 回以内) | 14 回以内<br>(土壌灌注<br>は 2 回以<br>内、散布、<br>常温煙霧、<br>くん煙及び<br>エアゾル剤の<br>噴射は合計<br>12 回以内) |
|       | メロン          | うどんこ病          |                  |                   |                  |          |  |  |  |
| すいか   | つる枯病         | 炭疽病<br>褐色腐敗病   |                  | 800～<br>1000 倍    | 収穫 7<br>日前ま<br>で |          | 5 回以内  |  |  |

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺菌剤

名称：フォリオゴールド

種類：メタラキシル M・TPN 水和剤

| 作物名    | 適用病害虫名  | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期                 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メタラキシル及びメタラキシル M を含む農薬の総使用回数        | TPN を含む農薬の総使用回数 |   |   |       |   |
|--------|---------|------------|--------------|----------------------|---------|------|-------------------------------------|-----------------|---|---|-------|---|
| たまねぎ   | べと病     | 800～1000 倍 | 100～400L/10a | 収穫 7 日前まで            | 3 回以内   | 散布   | 4 回以内<br>(種子への処理は 1 回以内、は種後は 3 回以内) | 6 回以内           |   |   |       |   |
|        | 灰色かび病   | 800 倍      |              |                      |         |      |                                     |                 |   |   |       |   |
|        | 白色疫病    |            |              |                      |         |      |                                     |                 |   |   |       |   |
| ねぎ     |         | 800～1000 倍 |              | 収穫 14 日前まで           |         |      |                                     | 2 回以内           | 4 回以内(種子への処理は 1 回以内、土壌混和は 1 回以内、散布は 3 回以内)  | 4 回以内(土壌灌注は 1 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 3 回以内)             |       |   |
| わけぎ    | べと病     |            |              |                      |         |      |                                     |                 |   |   |       |   |
| キャベツ   | ピシウム腐敗病 | 1000 倍     |              |                      |         |      |                                     |                 |   |   |       |   |
| はくさい   | 白さび病    | 800～1000 倍 |              | 収穫 7 日前まで            |         |      |                                     | 3 回以内           | 4 回以内<br>(種子への処理は 1 回以内、は種後は 3 回以内)         | 3 回以内<br>(は種又は定植前の土壌混和は 1 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 2 回以内) |       |   |
| レタス    |         | 800 倍      |              | 収穫 14 日前まで           |         |      |                                     |                 |   |   | 3 回以内 | 5 回以内<br>(土壌灌注は 2 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 3 回以内) |
| リーフレタス | べと病     |            |              | 収穫 21 日前まで           |         |      |                                     |                 |   |   |       |   |
| ブロッコリー |         | 1000 倍     |              | 出蕾前<br>但し、収穫 21 日前まで |         |      |                                     | 2 回以内           | 4 回以内 (種子への処理は 1 回以内、土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内) | 3 回以内(土壌灌注は 1 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 2 回以内)             |       |   |

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

## 殺菌剤

## 名称：フォリオゴールド

種類：メタラキシル M・TPN 水和剤

| 作物名    | 適用<br>病害虫名 | 希釈<br>倍数 | 使用<br>液量         | 使用時期                         | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用<br>方法       | メタラキシル及<br>びメタラキシル<br>Mを含む農薬の<br>総使用回数     | TPN を含む農<br>薬の総使用回<br>数                    |
|--------|------------|----------|------------------|------------------------------|---------------------|----------------|--|--|
| アスパラガス | 疫病         | 1000 倍   | 100～<br>400L/10a | 収穫前日<br>まで                   | 3 回<br>以内           | 散布             | 4 回以内<br>(種子への処理は<br>1 回以内、は種後<br>は 3 回以内) | 4 回以内                                      |
| らっきょう  | 白色疫病       |          |                  | 収穫 14 日<br>前まで               |                     |                |  |  |
| うど     | 疫病         | 800 倍    | —                | 伏込時<br>但し、収<br>穫 25 日前<br>まで | 1 回                 | 根株<br>瞬間<br>浸漬 | 1 回  | 4 回以内(散布<br>は 3 回以内、<br>根株瞬間浸漬<br>は 1 回以内) |
| ひろしまな  | 白さび病       | 1000 倍   | 100～<br>400L/10a | 収穫 28 日<br>前まで               | 2 回<br>以内           | 散布             | 4 回以内<br>(種子への処理は<br>1 回以内、は種後<br>は 3 回以内) | 2 回以内                                      |

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社 東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号