

適用の範囲と使用方法

2018年10月10日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農業の総使用回数	パラコートを含む農業の総使用回数
				薬量	希釈水量				
移植水稻	—	一年生雑草	秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで	800~1000mL/10a	100~150L/10a	1回		1回	2回以内
直播水稻			秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、は種前14日~は種後7日(イネ出芽前)	600~1000mL/10a					
麦類	圃場内の周縁部	一年生雑草	は種前又はは種後出芽前	1000~2000mL/10a	100~150L/10a	4回以内		4回以内	4回以内
			雑草生育期						
さとうきび		多年生雑草	雑草生育期 但し、収穫3日前まで	1000~2000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内
未成熟とうもろこし	—	一年生雑草	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで(草丈30cm以下)	600~1000mL/10a	100~150L/10a	5回以内		5回以内	5回以内
とうもろこし(子実)			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫45日前まで(草丈30cm以下)						
豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	—	一年生雑草	は種前又は植付前	600~1000mL/10a	100~150L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内
			畦間処理: 雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫3日前まで						
だいず			は種前又は植付前	600~1000mL/10a	100~150L/10a	4回以内		4回以内	4回以内
	は種後出芽前雑草生育期(草丈20cm以下)								
いも類(ばれいしょ、かんしょ、やまのいも、さといも、こんにゃく、みずいもを除く)	—	一年生雑草	植付前	600~1000mL/10a	100~150L/10a	3回以内		3回以内	3回以内
			畦間処理: 雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫3日前まで						
えだまめ	—	一年生雑草	畦間処理: 雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫14日前まで	600~1000mL/10a	100~150L/10a	4回以内		4回以内	4回以内
			雑草生育期 但し、収穫3日前まで						
ばれいしょ	—	一年生雑草	萌芽直前	400~600mL/10a	100~150L/10a	2回以内		2回以内(茎葉枯凋は1回以内)	2回以内
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	200~300mL/10a(北海道)					

適用の範囲と使用方法

2018年10月10日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農業の総使用回数	パラコートを含む農業の総使用回数
				薬量	希釈水量				
かんしょ やまのいも	-	一年生雑草	植付前	600~ 1000mL/10a	100~150L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内	3回以内
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで						
植付前									
畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで									
植付前									
植付後から萌芽直前									
こんにく		雑草生育期 但し、収穫30日前まで							
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで						
果樹類 (かんきつを除く)		多年生雑草	800~ 1000mL/10a	5回以内		5回以内	5回以内		
		スギナ	1500~ 2000mL/10a						
かんきつ	一年生雑草	1000~ 2000mL/10a	5回以内	5回以内	5回以内				
	多年生雑草	800~ 1000mL/10a							
いちご	スギナ	1500~ 2000mL/10a	5回以内	5回以内	5回以内				
	ツユクサ	1000~ 2000mL/10a							
野菜類 (レタス、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、だいこん、にんじん、ごぼう、たまねぎ、トマト、きゅうり、すいか、メロン、なす、ほうれんそう、ピーマン、かぼちゃ、アスパラガス、パセリ、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、うど、やまのいも(むかご)、しょうが、にんにく、たけのこ、いちごを除く)	は種前又は植付前	600~ 1000mL/10a	3回以内	3回以内	3回以内				
	定植前又は畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで								
キャベツ カリフラワー だいこん ごぼう	は種前又は植付前	600~ 1000mL/10a	3回以内	3回以内	3回以内				
	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫30日前まで								
トマト きゅうり ほうれんそう ピーマン かぼちゃ	は種前又は植付前	600~ 1000mL/10a	3回以内	3回以内	3回以内				
	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫14日前まで								

適用の範囲と使用方法

2018年10月10日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農業の総使用回数	パラコートを含む農業の総使用回数
				薬量	希釈水量				
はくさい ブロッコリー レタス たまねぎ ねぎ にんじん なす すいか メロン しょうが にんにく		一年生雑草	は種前 又は植付前	600～ 1000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内
			は種前又は植付前						
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで						
アスパラガス		スギナ	は種前又は植付前	1000～ 2000mL/10a					
			萌芽前: 雑草生育期 (草丈20cm以下)						
ふき		一年生雑草	萌芽前	600～ 1000mL/10a	100～150L/10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内
			畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫21日前まで						
みょうが(花穂)			萌芽前						
みょうが(茎葉)			畦間処理: 雑草生育期 但し、みょうが(花穂)の 収穫30日前まで、花穂を 収穫しない場合にあって は開花期終了まで						
うど			畦間処理: 雑草生育期 (根株養成期) 但し、収穫75日前まで						
はとむぎ			畦間処理: 雑草生育期 (出穂前まで) 但し、収穫60日前まで						
パセリ やまのいも (むかご)			は種前又は植付前						
たけのこ		一年生及び多 年生雑草	萌芽前: 雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫7日前まで	1000～ 2000mL/10a		3回以内		3回以内	3回以内
茶		一年生雑草	摘採7日前まで	800～ 1000mL/10a				1回	1回
桑	春期萌芽前又は伐採後								
たばこ	大土寄期畦間処理 : 雑草生育期								

適用の範囲と使用方法

2018年10月10日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量					
チューリップ	-	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草生育期)	600~ 1000mL/10a	100~150L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内 (ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)	3回以内 (ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)	
花き類・観葉植物 (チューリップ、すいせんを除く)			畦間処理: 雑草生育期 (草丈20cm以下)							
すいせん			萌芽前(雑草生育期)							
樹木類			雑草生育期 (草丈30cm以下)							
水田作物 畑作物(休耕田)	休耕田	雑草生育期	雑草生育期	800~ 1000mL/10a	4回以内	4回以内	4回以内	4回以内		
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔			600~ 1000mL/10a					5回以内	5回以内
				1000~ 2000mL/10a						
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、宅地、のり面等	多年生雑草	1500~ 2000mL/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	3回以内			
		一年生雑草	800~ 1000mL/10a							
		スギナ	スギナ生育期					1000~ 2000mL/10a		

目的の範囲と使用方法

作物名	使用目的	使用薬量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクワットを含む農薬の総使用回数	パラコートを含む農薬の総使用回数
チューリップ	ウイルス罹病株の枯殺	1mL/株	第2葉展開期から 開花20日後まで	1回/罹病株	ウイルス罹病株葉への滴下	3回以内 (ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)	3回以内 (ウイルス罹病株の枯殺は1回以内)