

**除草剤**  
**名称：プリグロックスL**  
 種類：ジクワット・パラコート液剤

適用の範囲と使用方法

2023 年 9 月 27 日現在

| 作物名                                       | 適用場所    | 適用雑草名 | 使用時期  | 使用量            |              | 本剤の使用回数 | 使用方法   | ジクワットを含む農薬の総使用回数 | パラコートをを含む農薬の総使用回数      |                      |
|---|---------|-------|---|----------------|--------------|---------|--------|------------------|------------------------|----------------------|
|   |         |       |   | 薬量             | 希釈水量         |         |        |                  |                        |                      |
| 移植水稻                                      | —       | 一年生雑草 | 秋期稲刈取後又は春期水田耕起 1 ヶ月前から直前まで                                | 800～1000mL/10a | 100～150L/10a | 1 回     | 雑草茎葉散布 | 1 回              | 1 回                    |                      |
| 直播水稻                                      |         |       | 秋期稲刈取後又は春期水田耕起 1 ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、は種前 14 日～は種後 7 日（イネ出芽前） |                |              |         |        |                  |                        |                      |
| 麦類  | 圃場内の周縁部 |       | は種前又はは種後出芽前   | 600～1000mL/10a |              | 4 回以内   |        | 4 回以内            | 4 回以内                  |                      |
|   |         |       | 雑草生育期   |                |              |         |        |                  |                        |                      |
| はとむぎ                                      | —       |       | 畦間処理：雑草生育期（出穂前まで） 但し、収穫 60 日前まで                           | 400～600mL/10a  |              | 2 回以内   |        | 2 回以内            | 2 回以内<br>(茎葉枯凋は 1 回以内) |                      |
| ばれいしょ                                     |         |       | 萌芽直前  |                |              |         |        |                  |                        | 200～300mL/10a (北海道)  |
|   |         |       | 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫前日まで                                      |                |              |         |        |                  |                        | 400～600mL/10a        |
| いも類 (ばれいしょ、かんしょ、やまのいも、さといも、こんにやく、みずいもを除く) | —       |       | 植付前   | 600～1000mL/10a |              | 3 回以内   |        | 3 回以内            | 3 回以内                  |                      |
| かんしょ<br>やまのいも                             |         |       | 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫 30 日前まで                                  |                |              |         |        |                  |                        |                      |
| さといも                                      |         |       | 植付前   |                |              |         |        |                  |                        | 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫前日まで |

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

除草剤

名称：プリグロックスL

種類：ジクワット・パラコート液剤

| 作物名   | 適用場所  | 適用雑草名           | 使用時期                   | 使用量             |              | 本剤の使用回数 | 使用方法   | ジクワットを含む農薬の総使用回数 | パラコートを含ま農薬の総使用回数 |
|---|-------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|---------|--------|------------------|------------------|
|   |       |                 |                        | 薬量              | 希釈水量         |         |        |                  |                  |
| こんにゃく   |       | 一年生雑草           | 植付前                    | 600～1000mL/10a  |              | 3回以内    |        | 3回以内             | 3回以内             |
|   |       |                 | 植付後から萌芽直前              |                 |              |         |        |                  |                  |
|   |       |                 | 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫30日前まで |                 |              |         |        |                  |                  |
| 果樹類<br>(かんきつを除く)  |       | 多年生雑草           | 雑草生育期 但し、収穫前日まで        | 800～1000mL/10a  | 100～150L/10a | 5回以内    | 雑草茎葉散布 | 5回以内             | 5回以内             |
|   |       | スギナ             |                        | 1500～2000mL/10a |              |         |        |                  |                  |
|   |       | 一年生雑草           |                        | 1000～2000mL/10a |              |         |        |                  |                  |
| かんきつ  | 多年生雑草 | 800～1000mL/10a  |                        |                 |              |         |        |                  |                  |
|   | スギナ   | 1500～2000mL/10a |                        |                 |              |         |        |                  |                  |
|   | ツユクサ  | 1000～2000mL/10a |                        |                 |              |         |        |                  |                  |
| 野菜類 (レタス、キャベツ、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、ねぎ、だいこん、にんじん、ごぼう、たまねぎ、トマト、きゅうり、すいか、メロン、なす、ほうれんそう、ピーマン、かぼちゃ、アスパラガス、パセリ、ふき、みょうが (花穂)、みょうが (茎葉)、うど、やまのいも (むかご)、しょうが、にんにく、たけのこ、いちごを除く) | -     | 一年生雑草           | は種前又は植付前               | 600～1000mL/10a  |              | 3回以内    |        | 3回以内             | 3回以内             |
| キャベツ<br>カリフラワー<br>だいこん<br>ごぼう   |       |                 | 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫30日前まで |                 |              |         |        |                  |                  |

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

除草剤

名称：プリグロックスL

種類：ジクワット・パラコート液剤

| 作物名   | 適用場所                  | 適用雑草名               | 使用時期                     | 使用量            |              | 本剤の使用回数 | 使用方法   | ジクワットを含む農薬の総使用回数 | パラコートを含む農薬の総使用回数 |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------|--------|------------------|------------------|
|   |                       |                     |                          | 薬量             | 希釈水量         |         |        |                  |                  |
| トマト<br>きゅうり<br>ほうれんそう<br>ピーマン<br>かぼちゃ   | —                     | 一年生雑草               | は種前又は植付前                 | 600~1000mL/10a | 100~150L/10a | 3回以内    | 雑草茎葉散布 | 3回以内             | 3回以内             |
| いちご   |                       |                     | 畦間処理：雑草生育期但し、収穫14日前まで    |                |              |         |        |                  |                  |
|   |                       |                     | は種前又は植付前                 |                |              |         |        |                  |                  |
| アスパラガス  |                       |                     | 定植前又は畦間処理：雑草生育期但し、収穫前日まで |                |              |         |        |                  |                  |
|   |                       |                     | は種前又は植付前                 |                |              |         |        |                  |                  |
|   |                       |                     | 畦間処理：雑草生育期但し、収穫前日まで      |                |              |         |        |                  |                  |
| スギナ   |                       | 萌芽前：雑草生育期（草丈20cm以下） | 1000~2000mL/10a          | 3回以内           | 雑草茎葉散布       | 3回以内    | 3回以内   |                  |                  |
|   |                       | 畦間処理：雑草生育期但し、収穫前日まで |                          |                |              |         |        |                  |                  |
| はくさい<br>ブロッコリー<br>レタス<br>たまねぎ<br>ねぎ<br>にんじん<br>なす<br>すいか<br>メロン<br>しょうが<br>にんにく |                       | 一年生雑草               | は種前又は植付前                 | 600~1000mL/10a | 100~150L/10a | 3回以内    | 雑草茎葉散布 | 3回以内             | 3回以内             |
| 茶   |                       |                     | 畦間処理：雑草生育期但し、収穫3日前まで     |                |              |         |        |                  |                  |
|   | 摘採7日前まで               |                     |                          |                |              |         |        |                  |                  |
| ふき  | 萌芽前                   |                     | 800~1000mL/10a           | 2回以内           |              |         |        |                  |                  |
|   | 畦間処理：雑草生育期但し、収穫21日前まで |                     |                          |                |              |         |        |                  |                  |
| みょうが<br>(花穂)  | 萌芽前                   | 600~1000mL/10a      | 2回以内                     | 雑草茎葉散布         | 2回以内         | 2回以内    |        |                  |                  |
|   | 畦間処理：雑草生育期但し、収穫30日前まで |                     |                          |                |              |         |        |                  |                  |

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

除草剤

名称：プリグロックスL

種類：ジクワット・パラコート液剤

| 作物名                     | 適用場所                                 | 適用雑草名                   | 使用時期   | 使用量                 |                  | 本剤の使用回数        | 使用方法 | ジクワットを含む農薬の総使用回数 | パラコートを含ま農薬の総使用回数 |                    |      |      |      |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|------|------|------|
|                         |                                      |                         |  | 薬量                  | 希釈水量             |                |      |                  |                  |                    |      |      |      |
| みょうが<br>(茎葉)            | —                                    | 一年生雑草                   | 萌芽前  | 600～<br>1000mL/10a  | 100～<br>150L/10a | 雑草<br>茎葉<br>散布 |      | 2回以内             | 2回以内             |                    |      |      |      |
|                         |                                      |                         | 畦間処理：雑草生育期 但し、みょうが（花穂）の収穫 30 日前まで、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで |                     |                  |                |      |                  |                  |                    |      |      |      |
| たけのこ                    |                                      | 一年生及び多年生雑草              | 萌芽前：雑草生育期（草丈 30cm 以下） 但し、収穫 7 日前まで                       | 1000～<br>2000mL/10a |                  |                |      |                  |                  | 3回以内               | 3回以内 | 3回以内 |      |
| うど                      |                                      | 一年生雑草                   | 畦間処理：雑草生育期（根株養成期） 但し、収穫 75 日前まで                          | 600～<br>1000mL/10a  |                  |                |      |                  |                  | 2回以内               | 2回以内 | 2回以内 |      |
| やまのいも<br>(むかご)<br>パセリ   |                                      |                         | は種前又は植付前   |                     |                  |                |      |                  |                  | 100～<br>150L/10a   | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
|                         |                                      |                         | 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫 7 日前まで                                  |                     |                  |                |      |                  |                  |                    |      |      |      |
| 豆類（種実、ただし、だいず、らっかせいを除く） |                                      |                         | は種前又は植付前   |                     |                  |                |      |                  |                  | 600～<br>1000mL/10a | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
|                         |                                      |                         | 畦間処理：雑草生育期（草丈 30cm 以下） 但し、収穫 3 日前まで                      |                     |                  |                |      |                  |                  |                    |      |      |      |
| だいず                     |                                      |                         | は種前又は植付前   |                     |                  |                |      |                  |                  | 600～<br>1000mL/10a | 4回以内 | 4回以内 | 4回以内 |
|                         |                                      | は種後出芽前雑草生育期（草丈 20cm 以下） |  |                     |                  |                |      |                  |                  |                    |      |      |      |
|                         | 畦間処理：雑草生育期（草丈 30cm 以下） 但し、収穫 3 日前まで  |                         |  |                     |                  |                |      |                  |                  |                    |      |      |      |
| えだまめ                    | 畦間処理：雑草生育期（草丈 30cm 以下） 但し、収穫 14 日前まで |                         |  |                     |                  |                |      |                  |                  |                    |      |      |      |

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

除草剤

名称：プリグロックスL

種類：ジクワット・パラコート液剤

| 作物名                      | 適用場所               | 適用雑草名                            | 使用時期                 | 使用量             |                | 本剤の使用回数      | 使用方法                 | ジクワットを含む農薬の総使用回数 | パラコートを含む農薬の総使用回数 |                |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
|                          |                    |                                  |                      | 薬量              | 希釈水量           |              |                      |                  |                  |                |
| さとうきび                    | 圃場内の周縁部            | 一年生雑草                            | 雑草生育期 但し、収穫3日前まで     | 600～1000mL/10a  | 100～150L/10a   | 3回以内         | 雑草茎葉散布               | 3回以内             | 3回以内             |                |
|                          |                    | 多年生雑草                            |                      | 1000～2000mL/10a |                |              |                      |                  |                  |                |
| 未成熟とうもろこし                | 一年生雑草              | 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫3日前まで            | 600～1000mL/10a       | 5回以内            |                | 5回以内         |                      | 5回以内             | 5回以内             |                |
| とうもろこし(子実)               |                    | 畦間処理：雑草生育期 但し、収穫45日前まで(草丈30cm以下) |                      |                 |                |              |                      |                  |                  |                |
| 桑                        |                    | 春期萌芽前又は伐採後                       |                      |                 |                |              |                      |                  |                  | 800～1000mL/10a |
| たばこ                      |                    | 大土寄期畦間処理：雑草生育期                   | 1回                   | 1回              |                | 1回           |                      |                  |                  |                |
| 花き類・観葉植物(チューリップ、すいせんを除く) |                    | 一年生雑草                            | 畦間処理：雑草生育期(草丈20cm以下) | 600～1000mL/10a  |                | 3回以内         |                      | 3回以内             | 3回以内             | 3回以内           |
| すいせん                     |                    |                                  | 萌芽前(雑草生育期)           |                 |                |              |                      |                  |                  |                |
| チューリップ                   |                    |                                  | 植付後萌芽前(雑草生育期)        |                 |                |              |                      |                  |                  |                |
|                          |                    |                                  | 畦間処理：雑草生育期(草丈20cm以下) |                 |                |              |                      |                  |                  |                |
| 樹木類                      |                    | 雑草生育期(草丈30cm以下)                  | 3回以内                 | 3回以内            |                |              |                      |                  |                  |                |
| 水田作物、畑作物(休耕田)            |                    | 休耕田                              | 多年生雑草                | 雑草生育期           | 800～1000mL/10a | 100～150L/10a | 4回以内                 | 4回以内             | 4回以内             |                |
| 水田作物(水田畦畔)               | 水田畦畔               | 600～1000mL/10a                   |                      |                 | 5回以内           |              | 5回以内                 | 5回以内             |                  |                |
|                          |                    | 1000～2000mL/10a                  |                      |                 |                |              |                      |                  |                  |                |
| 樹木等                      | 公園庭園堤とう駐車場道路宅地のり面等 | 一年生雑草                            | スギナ生育期               | 800～1000mL/10a  | 100～150L/10a   | 3回以内         | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内             | 3回以内             |                |
|                          |                    | 多年生雑草                            |                      | 1500～2000mL/10a |                |              |                      |                  |                  |                |
|                          |                    | スギナ                              |                      | 1000～2000mL/10a |                |              |                      |                  |                  |                |

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

## 除草剤

## 名称：プリグロックスL

種類：ジクワット・パラコート液剤

| 作物名    | 使用目的       | 使用薬量  | 使用時期             | 本剤の使用回数 | 使用方法         | ジクワットを含む農薬の総使用回数      | パラコートを含む農薬の総使用回数      |
|--------|------------|-------|------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| チューリップ | ウイルス罹病株の枯殺 | 1mL/株 | 第2葉展開期から開花20日後まで | 1回/罹病株  | ウイルス罹病株葉への滴下 | 3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内) | 3回以内(ウイルス罹病株の枯殺は1回以内) |