

除草剤

名称：ボクサー
種類：プロスルホカルブ乳剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2022 年 4 月 20 日現在

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	プロスルホカルブ を含む農薬の総使 用回数
			薬量	希釈水量			
小麦	一年生 雑草	秋播栽培の は種後 ～麦 2 葉期 (雑草発生前～発生始 期)	400 ～ 500mL/10a	50～ 100L/10a	2 回 以内	雑草 茎葉 散布 又は 全面 土壌 散布	2 回以内
		秋播栽培の 麦 2～4 葉期 (雑草発生前～発生始 期)		70～ 100L/10a			
		春播栽培の は種後出芽前～出芽揃期 (雑草発生前～発生始 期)	500mL/10a	100L/10a			
大麦		秋播栽培の は種後～ 麦 2 葉期 (雑草発生前～発生始 期)	400 ～ 500mL/10a	70～ 100L/10a	1 回		
麦類 (大麦、小麦を除 く)		は種後出芽前 (雑草発生前)		100L/10a			
とうもろこし		植付後萌芽前 (雑草発生前)	100～ 200L/10a	2 回 以内	2 回 以内		
飼料用 とうもろこし	定植後又は中耕後(雑草 発生前) 但し、収穫 45 日 前まで						
ばれいしょ							
たまねぎ							