

殺虫剤  
**名称：マツチ乳剤**  
 種類：ルフェスロン乳剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2023 年 12 月 20 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ルフェスロンを含む農 薬の総使用 回数
りんご	ハマキムシ類	2000 倍	200～ 700L/10a	収穫 14 日 前まで	3 回 以内	散布	3 回 以内
	キンモンホソガ	2000～ 3000 倍					
みかん	チャノキイロアザミウ マ		2000～ 3000 倍	収穫 14 日 前まで	2 回 以内		2 回 以内
かんきつ (み かんを除く)	ミカンハモグリガ ミカンサビダニ アゲハ類 ヨモギエダシヤク	3000 倍					
	かんしょ		ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	3000 倍	収穫 14 日 前まで		3 回 以内
ばれいしょ	ハスモンヨトウ	2000～ 3000 倍	収穫 7 日 前まで				
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ			3000 倍	100～ 300L/10a		収穫 14 日 前まで
	はくさい	ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ	2000 倍				
だいこん	コナガ アオムシ	2000 倍		収穫 7 日 前まで	3 回 以内		3 回 以内
非結球あぶら な科葉菜類	ハスモンヨトウ		2000 倍				
ブロッコリー	シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ	2000 倍		収穫 前日 まで	2 回 以内	2 回 以内	
ねぎ	シロイチモジヨトウ		2000～ 3000 倍				3000 倍
わけぎ	オオタバコガ	1000～ 2000 倍		2000 倍	2 回 以内	2 回 以内	
トマト	ハスモンヨトウ		2000 倍				2000 倍
	アザミウマ類	2000 倍		2000 倍	2 回 以内	2 回 以内	
	トマトサビダニ コナジラミ類		1000 倍				1000 倍
	ハモグリバエ類	2000～ 3000 倍		3000 倍	2 回 以内	2 回 以内	
	ミニトマト		オオタバコガ				2000 倍
	ハスモンヨトウ	2000 倍	2000 倍	2 回 以内	2 回 以内		
	アザミウマ類 トマトサビダニ コナジラミ類					2000 倍	2000 倍

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

殺虫剤  
**名称：マツチ乳剤**  
 種類：ルフェヌロン乳剤

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ルフェヌロ ンを含む農 薬の総使用 回数
なす	アザミウマ類	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	4 回 以内	散布	4 回 以内
ピーマン とうがらし類	オオタバコガ						
レタス 非結球レタス	ウリノメイガ コナジラミ類			収穫 3 日 前まで	3 回 以内		3 回 以内
きゅうり		収穫前日 まで	4 回 以内				
いちご	アザミウマ類	1000～ 2000 倍	80～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内		4 回 以内
		3000 倍					
だいず	ハスモンヨトウ	2000～ 3000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	2 回 以内		2 回 以内
えだまめ							
しそ	シソサビダニ	2000 倍	25L/10a	収穫 14 日 前まで	2 回 以内	2 回 以内	
てんさい	ヨトウムシ	750 倍					
		ヨトウムシ カメノコハムシ アシグロハモグリバエ シロオビノメイガ	3000 倍	100～ 150L/10a			
茶	チャハマキ チャノコカクモンハマ キ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウ マ チャノホソガ	2000～ 3000 倍	200～ 400L/10a	摘採 7 日 前まで	1 回	1 回	
きく	アザミウマ類 マメハモグリバエ	1000 倍	100～ 300L/10a	発生初期	5 回 以内	5 回 以内	
	花き類・観葉 植物（きくを 除く）	ハスモンヨトウ					2000 倍

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。