

殺虫剤

名称:リーズン顆粒水和剤
種類:チアメトキサム・ルフェスロン水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年8月25日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数	ルフェスロンを含む農薬の総使用回数
りんご	クワコナカイガラムシ ハマキムシ類 シンクイムシ類 ヨモギエダシヤク	2000倍	200～ 700L/10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内
	ギンモンハモグリガ キンモンホソガ アブラムシ類 リンゴサビダニ							
みかん	チャノキイロアザミウマ アゲハ類 ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ	2000～ 3000倍			3回以内		3回以内	
かんきつ (みかんを除く)	成虫 ミカンサビダニ			収穫21日前 まで	1回			1回
てんさい	アブラムシ類 ヨトウムシ カメノコハムシ シロオビノメイガ	3000倍	100～ 150L/10a	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機による 散布	5回以内(種子への処理は1回以内、苗床灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)	2回以内
		750倍	25L/10a					
		40倍	1.6L/10a					
茶	チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ ヨモギエダシヤク チャハマキ チャノコカクモンハマキ	2000倍	200～ 400L/10a	摘採7日前 まで	1回	散布	1回	1回