

殺菌剤

名称:リドミルゴールドMZ
種類:マンゼブ・メタラキシルM水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年4月7日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
ねぎ	べと病	1000倍	100~300L /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	5回以内 (種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内、散布は3回以内)
キャベツ				収穫30日前まで				
きゅうり				収穫前日まで				
はくさい	ピシウム腐敗病	500~1000倍	100~300L /10a	収穫30日前まで	1回	2回以内	1回	4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
かぼちゃ	疫病							
たまねぎ	べと病	500~1000倍	100~300L /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	5回以内	4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
	白色疫病	1000倍						
あずき	茎疫病	500倍	100~300L /10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)
だいず				収穫45日前まで				4回以内 (種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内)
メロン	べと病	1000倍	200~700L /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	5回以内	4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
ぶどう	褐色腐敗病			収穫45日前まで				
みかん				収穫30日前まで				2回以内
すいか				100~300L /10a				収穫7日前まで
わさびだいこん	白さび病	200~400L /10a	収穫14日前まで	3回以内	3回以内			

殺菌剤

名称:リドミルゴールドMZ
種類:マンゼブ・メタラキシルM水和剤

適用の範囲と使用方法

2021年4月7日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
トマト	疫病	1000倍	100～300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	5回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は4回以内)
ばれいしょ		500～1000倍		収穫30日前まで	1回		10回以内 (無人航空機散布は3回以内)	3回以内
いちご		1000倍	50mL/株 (200～400L/10a)	育苗期	3回以内		6回以内	5回以内 (種子への処理は1回以内、育苗期は3回以内、定植時の土壌混和は1回以内)