

殺菌剤

名称：リドミルゴールドMZ

種類：マンゼブ・メタラキシルM水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024年7月24日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゼブを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数					
ばれいしょ	疫病	500～1000倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	10回以内 (無人航空機散布は3回以内)	3回以内					
トマト				収穫前日まで	2回以内		2回以内	5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内)					
キャベツ	べと病	1000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内	3回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)				
ねぎ				収穫14日前まで					5回以内(種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内、散布は3回以内)				
きゅうり				収穫前日まで						4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)			
メロン				収穫7日前まで							5回以内		
ぶどう				褐色腐敗病						200～700L/10a	収穫45日前まで	2回以内	2回以内
みかん									収穫30日前まで		1回	4回以内	
はくさい	べと病	500～1000倍		100～300L/10a	収穫30日前まで		2回以内	5回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)				
かぼちゃ	ピシウム腐敗病												
	疫病												
たまねぎ	べと病		500～1000倍			収穫7日前まで				3回以内	5回以内	5回以内	
	白色疫病	500倍											
あずき	茎疫病	500倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	3回以内	4回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)						
だいず				べと病			収穫45日前まで	4回以内(種子粉衣及びは種前の塗沫処理は合計1回以内、は種後は3回以内)					
未成熟そらまめ	疫病	750倍	収穫30日前まで	3回以内	7回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)							
すいか	褐色腐敗病	1000倍	収穫7日前まで	3回以内	7回以内	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)							

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

## 殺菌剤

## 名称：リドミルゴールドMZ

種類：マンゼブ・メタラキシル M 水和剤

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	マンゼブを 含む農薬の 総使用回数	メタラキシル及びメ タラキシル M を含 む農薬の総使用回数
わさびだい こん	白さび病	1000 倍	200～ 400L/10a	収穫 14 日 前まで	3 回 以内	散 布	3 回以内	4 回以内 (種子への 処理は 1 回以内、は 種後は 3 回以内)
いちご	疫病		50mL/株 (200～ 400L/10a)	育苗期			6 回以内	5 回以内 (種子への 処理は 1 回以内、育 苗期は 3 回以内、定 植時の土壌混和は 1 回以内)

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。

シンジェンタジャパン株式会社 東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 10 号