

## 除草剤

名称: アクシズMX1キロ粒剤  
種類: ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロン粒剤

適用の範囲と使用方法

2016年4月20日現在

| 作物名  | 適用<br>雑草名  | 使用時期                                     | 使用量     | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法 | ピリフタリドを<br>含む農薬の<br>総使用回数 | メソトリオン<br>を含む農薬<br>の総使用回<br>数 | メタゾスルフ<br>ロンを含む<br>農薬の総使<br>用回数 |
|------|--|--|---------|-------------|------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 移植水稻 | 水田一年生雑<br>草及び<br>マツバイ<br>ホタルイ<br>ウリカワ<br>ミズガヤツリ<br>ヘラオモダカ<br>ヒルムシロ<br>セリ<br>クログワイ<br>オモダカ<br>シズイ<br>コウキヤガラ | 移植後7日～ノ<br>ビエ4葉期た<br>だし、収穫45日<br>前<br>まで | 1kg/10a | 1回          | 湛水散布 | 2回以内                      | 2回以内                          | 2回以内                            |
|      | 無人ヘリ<br>コプター<br>による散<br>布  |  |         |             |      |                           |                               |                                 |
| 直播水稻 | 水田一年生雑<br>草及び<br>マツバイ<br>ホタルイ<br>ミズガヤツリ<br>ヒルムシロ<br>セリ   | 稲1葉期～ノ<br>ビ<br>エ4葉期<br>ただし、収穫45<br>日前まで  |         |             | 湛水散布 |                           |                               |                                 |
|      | 無人ヘリ<br>コプター<br>による散<br>布  |  |         |             |      |                           |                               |                                 |