

殺虫剤

名称：ミネクトエクストラSC

種類：シアントラニリプロール・ルフェヌロン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024年5月15日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	ルフェヌロンを含む農薬の総使用回数	
かんきつ (みかんを除く)	ゴマダラカミ成虫 アザミヤ類 ミカンサビダニ ミカンハモグリガ	10000 倍	200～ 700L/10a	収穫 21 日前まで	1 回	散布	3 回以内	1 回	
みかん	アゲハ類 ヨモギエダシヤク			収穫 14 日前まで	3 回以内			3 回以内	3 回以内
なし	ハマキムシ類			収穫前日まで					
りんご	モモンクイガ ハマキムシ類 キンモンホリガ			収穫 14 日前まで					
ぶどう	チャノキイロアサミウマ			収穫前日まで					
かんしょ	ハスモンヨウ ナカシロシタバ	80 倍	100～ 300L/10a	1.6L/10a	収穫 14 日前まで	無人航空機による散布	2 回以内		
だいち	マメシクイガ カメムシ類 ハスモンヨウ	10000～ 12000 倍	100～ 300L/10a	0.8L/10a	1.6L/10a	収穫 7 日前まで		2 回以内	散布
		40～80 倍	4 回以内 (は種前の処理は 1 回以内、は種後の処理は 3 回以内)						無人航空機による散布
		80～160 倍							無人航空機による散布
えだまめ	10000～ 12000 倍	100～ 300L/10a	0.8L/10a	1.6L/10a	収穫前日まで	無人航空機による散布		2 回以内	散布
							40～80 倍		無人航空機による散布
							80～160 倍		

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。