

殺虫剤

名称：ミネクトエクストラSC

種類：シアントラニリプロール・ルフェヌロン水和剤

適用病害虫の範囲及び使用方法

2024年2月28日現在

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	シアントラニ リプロールを 含む農薬の総 使用回数	ルフェヌロンを含む農 薬の総使用 回数	
かんきつ (みかんを 除く)	ゴマダラカミキリ成虫 チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ ミカンハモグリガ アゲハ類	10000 倍	200～ 700L/10a	収穫 21 日 前まで	1 回	散布	3 回以内	1 回	
みかん				収穫 14 日 前まで					
なし				ハマキムシ類					収穫前日 まで
りんご				モモシクイガ ハマキムシ類 キンモノソガ					収穫 14 日 前まで
ぶどう				チャノキイロアザミウマ					収穫前日 まで
かんしょ	ハスモンヨウ カジロシタハ	80 倍	100～ 300L/10a 1.6L/10a	収穫 14 日 前まで	2 回 以内	無人 航空 機に よる 散布	2 回以内		
だいず	マメシクイガ	10000～ 12000 倍	100～ 300L/10a	収穫 7 日 前まで		散布			
		40～80 倍	0.8L/10a			無人 航空 機に よる 散布			
		80～160 倍	1.6L/10a						
えだまめ	マメシクイガ	10000～ 12000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで		散布			
		40～80 倍	0.8L/10a		無人 航空 機に よる 散布				
		80～160 倍	1.6L/10a						

使用上の注意事項などについては、弊社ウェブサイト (<https://www.syngenta.co.jp/cp>) を参照してください。